

非ステロイド性消炎・鎮痛剤
 日本薬局方

劇薬
 処方せん医薬品*

インドメタシン坐剤

インドメタシン坐剤 シオエ 12.5
 インドメタシン坐剤 シオエ 25
 インドメタシン坐剤 シオエ 50

Indometacin supp.

	12.5mg	25mg	50mg
承認番号	16100AMZ02477	16100AMZ02476	16100AMZ02475
薬価収載	1981年11月	1979年12月	1979年12月
販売開始	1981年11月	1979年12月	1979年12月

貯法：密閉容器、遮光、冷所保存

使用期限：外箱に記載

* 注意－医師等の処方せんにより使用すること。

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

- 消化性潰瘍のある患者（ただし、「(1) 慎重投与」の項参照）〔消化器への直接刺激作用及びプロスタグランジン合成阻害作用により、胃粘膜防御能が低下するため、消化性潰瘍が悪化するおそれがある。〕
- 重篤な血液の異常のある患者〔血液の異常が悪化するおそれがある。〕
- 重篤な肝障害のある患者〔肝障害が悪化するおそれがある。〕
- 重篤な腎障害のある患者〔プロスタグランジン合成阻害作用により、腎血流量低下及び水、ナトリウムの貯留が起こるため、腎障害が悪化するおそれがある。〕
- 重篤な心機能不全のある患者〔プロスタグランジン合成阻害作用により、水、ナトリウムの貯留が起こるため、心機能不全が悪化するおそれがある。〕
- 重篤な高血圧症の患者〔プロスタグランジン合成阻害作用により、水、ナトリウムの貯留が起こるため、血圧が上昇するおそれがある。〕
- 重篤な膵炎の患者〔膵炎が悪化するおそれがある。〕
- 本剤の成分又はサリチル酸系化合物（アスピリン等）に対し過敏症の既往歴のある患者
- 直腸炎、直腸出血又は痔疾のある患者〔直腸炎、直腸出血が悪化するおそれがある。また、痔疾のある患者で肛門（直腸）出血があらわれたとの報告がある。〕
- アスピリン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作の誘発）又はその既往歴のある患者〔重症喘息発作を誘発することがある。〕
- 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「(6) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）
- トリアムテレンを投与中の患者（「(3) 相互作用」の項参照）




【原則禁忌】（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）

小児〔他剤が無効又は使用できない関節リウマチに対して投与する場合には慎重に投与すること（「(7) 小児等への投与」の項参照）〕

【併用禁忌】（併用しないこと）

トリアムテレン（「(3) 相互作用」の項参照）

【組成・性状】

販売名	インドメタシン坐剤シオエ12.5	インドメタシン坐剤シオエ25	インドメタシン坐剤シオエ50
成分・含量（1個中）	日本薬局方インドメタシン12.5mg	日本薬局方インドメタシン25mg	日本薬局方インドメタシン50mg
添加物	ハードファット（基剤）		
性状	白色～淡黄色の円すい形坐剤である。		
外形サイズ	 a : 22mm b : 7mm	 a : 23mm b : 8mm	 a : 25mm b : 9mm
重量	725mg	925mg	1,250mg
識別コード	☉ 101 12.5mg	☉ 101 25mg	☉ 101 50mg
外装	乳白色パック		

【効能・効果】

- 下記疾患の消炎、鎮痛
 関節リウマチ、変形性関節症
- 手術後の炎症及び腫脹の緩解

【用法・用量】

インドメタシンとして、通常成人1回25～50mgを1日1～2回直腸内に投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。本剤の極量は1日200mgである。低体温によるショックを起こすことがあるので、高齢者に投与する場合には、少量から投与を開始する。

【使用上の注意】

(1) 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 消化性潰瘍の既往歴のある患者〔消化器への直接刺激作用及びプロスタグランジン合成阻害作用により、胃粘膜防御能が低下するため、消化性潰瘍が再発するおそれがある。〕
- 非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期投与による消化性潰瘍のある患者で、本剤の長期投与が必要であり、かつミソプロストールによる治療が行われている患者〔ミソプロストールは非ステロイド性消炎鎮痛剤により生じた消化性潰瘍を効能・効果としているが、ミソプロストールによる治療に抵抗性を示す消化性潰瘍もあるので、本剤を継続投与する場合には、十分経過を観察し、慎重に投与すること。〕

- 3) 血液の異常又はその既往歴のある患者 [血液の異常が悪化又は再発するおそれがある。]
- 4) 出血傾向のある患者 [血小板機能異常が起こることがあるため、出血傾向を助長するおそれがある。]
- 5) 肝障害又はその既往歴のある患者 [肝障害が悪化又は再発するおそれがある。]
- 6) 腎障害又はその既往歴のある患者 [プロスタグランジン合成阻害作用により、腎血流量低下及び水、ナトリウムの貯留が起こるため、腎障害が悪化又は再発するおそれがある。]
- 7) 心機能異常のある患者 [プロスタグランジン合成阻害作用により、水、ナトリウムの貯留が起こるため、心機能異常が悪化するおそれがある。]
- 8) 高血圧症の患者 [プロスタグランジン合成阻害作用により、水、ナトリウムの貯留が起こるため、血圧が上昇するおそれがある。]
- 9) 膵炎の患者 [症状が悪化するおそれがある。]
- 10) 過敏症の既往歴のある患者
- 11) てんかん、パーキンソン症候群等の中樞神経系疾患のある患者 [これらの症状が悪化するおそれがある。]
- 12) 気管支喘息のある患者 [重症喘息発作を誘発することがある。]
- 13) SLE (全身性エリテマトーデス)の患者 [副作用があらわれやすい。]
- 14) 潰瘍性大腸炎の患者 [症状が悪化するおそれがある。]
- 15) クロウン病の患者 [病状が悪化するおそれがある。]
- 16) 高齢者 (「(5) 高齢者への投与」の項参照)

(2) 重要な基本的注意

- 1) 消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留意すること。
- 2) 患者の状態を十分観察し、副作用の発現に留意すること。**過度の体温下降、虚脱、四肢冷却**等があらわれることがあるので、特に高熱を伴う高齢者又は消耗性疾患の患者においては、投与後の患者の状態に十分注意すること。
- 3) 慢性疾患 (関節リウマチ、変形性関節症等) に対し本剤を用いる場合には、次の事項を考慮すること。
ア. 長期投与する場合には、定期的に臨床検査 (尿検査、血液検査及び眼科的検査等) を行うこと。また、異常が認められた場合には、減量、休薬等の適切な措置を講ずること。
イ. 薬物療法以外の療法も考慮すること。
- 4) 急性疾患に対し本剤を用いる場合には、次の事項を考慮すること。
ア. 急性炎症、疼痛、発熱の程度を考慮し、投与すること。
イ. 原則として同一の薬剤の長期投与を避けること。
ウ. 原因療法があればこれを行うこと。
- 5) **感染症を不顕性化するおそれがある**ので、感染による炎症に対して用いる場合には、適切な抗菌剤を併用し、観察を十分行い慎重に投与すること。
- 6) **他の消炎鎮痛剤との併用は避けることが望ましい。**
- 7) 高齢者には副作用の発現に特に注意し、必要最小限の使用にとどめるなど慎重に投与すること。
- 8) 眠気、めまい、ふらつき感等があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。

(3) 相互作用

併用禁忌 (併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
トリアムテレン トリテレン等	相互に副作用が増強され、急性腎不全を起こすことがある。	トリアムテレンによる腎血流量の低下に基づく腎障害のために代償的に腎でのプロスタグランジン合成が亢進されるが、本剤によりそのプロスタグランジン合成が阻害されるためと考えられている。

併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
プロベネシド	本剤の血中濃度が上昇し、作用が増強されることがある。	腎尿細管での両薬の排泄部位での競合、本剤の胆汁排泄減少により、本剤の排泄が抑制され血中濃度が上昇するためと考えられている。
アスピリン	消化器系の副作用の発現率が上昇する。また、本剤の作用が減弱されることがある。	機序不明
※ 抗凝血剤及び抗血小板薬 ワルファリン レビパリン クロピドグレル等	これらの医薬品の作用を増強し、出血の危険性が増大することがある。血液凝固能検査等出血管理を十分に行う。	本剤のプロスタグランジン生合成阻害作用により血小板凝集が抑制される。また、本剤が血漿蛋白結合部位でワルファリンを遊離させ、その抗凝血作用を増強させると考えられている。
メトトレキサート ¹⁾	メトトレキサートの血中濃度が上昇し、その副作用を増強することがある。血中濃度をモニターし、メトトレキサートの量を調節すること。	本剤のプロスタグランジン合成阻害作用により腎血流量が減少し、メトトレキサートの尿細管分泌を抑制するためと考えられている。
※ リチウム	血中リチウム濃度が上昇し、リチウム中毒を呈したとの報告がある。	本剤のプロスタグランジン合成阻害作用により腎血流量が減少し、リチウムの腎排泄が減少するためと考えられている。
β-遮断剤 ACE阻害剤 ²⁾ A-II受容体拮抗剤 ³⁾	これらの医薬品の降圧作用を減弱させることがある。	本剤が、血管拡張作用を有するプロスタグランジンの合成を阻害し、血圧を上昇させることがある。
※※ ACE阻害剤 A-II受容体拮抗剤	腎機能が悪化している患者では、さらに腎機能が悪化するおそれがある。	本剤のプロスタグランジン合成阻害作用により腎血流量が低下するためと考えられている。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
※ ループ利尿剤 フロセミド等 チアジド系及びその 類似降圧利尿剤 ヒドロクロロチ アジド等	これらの医薬品の利尿降圧作用を減弱させることがある。	本剤がプロスタグランジン合成を阻害して、水、塩類の体内貯留が生じ、利尿剤の水、塩類排泄作用に拮抗するためと考えられている。
※ カリウム保持性利尿剤 スピロノラクトン等 エプレレノン	これらの医薬品の降圧作用の減弱、腎機能障害患者で重度の高カリウム血症が発現するおそれがある。	本剤の腎におけるプロスタグランジン合成阻害による高カリウム血症が認められている。
ジゴキシン	血中ジゴキシン濃度が上昇し、作用が増強されることが報告されているので血中ジゴキシン濃度に注意すること。	本剤のプロスタグランジン合成阻害作用により腎血流量が減少し、ジゴキシンの腎排泄が減少するためと考えられている。
シクロスポリン	シクロスポリンによる腎毒性が増強されることがあるので、腎機能に注意すること。	本剤のプロスタグランジン合成阻害作用により腎血流量が減少するためと考えられている。

(4) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

●重大な副作用（頻度不明）

次のような副作用があらわれることがあるので、症状があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

1) ショック、アナフィラキシー様症状 冷汗、顔面蒼白、呼吸困難、血圧低下等があらわれることがあるので観察を十分に行うこと。

※ 2) 消化管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍、腸管の狭窄・閉塞、潰瘍性大腸炎

3) 再生不良性貧血、溶血性貧血、骨髄抑制、無顆粒球症 血液検査を行うなど観察を十分に行うこと。

※※ 4) 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、剥脱性皮膚炎（いずれも頻度不明）

5) 喘息発作（アスピリン喘息） 喘息発作等の急性呼吸障害があらわれることがある。

6) 急性腎不全、間質性腎炎、ネフローゼ症候群 乏尿、血尿、尿蛋白、BUN・血中クレアチニン上昇、高カリウム血症、低アルブミン血症等があらわれることがある。⁴⁾

7) 痙攣、昏睡、錯乱

8) 性器出血

9) うっ血性心不全、肺水腫

10) 血管浮腫

11) 肝機能障害、黄疸 肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、検査を実施するなど観察を十分に行うこと。

●その他の副作用

次のような副作用が認められた場合には、必要に応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。

種類\頻度	頻度不明
消化器	腹痛、食欲不振、消化不良、悪心・嘔吐、下痢・軟便、便秘、直腸粘膜の刺激症状、直腸炎 ^{注1)} 、腹部膨満感、口渇、口内炎、胃炎、限局性回腸炎 ^{注1)} 、脾炎

種類\頻度	頻度不明
血液 ^{注2)}	貧血、紫斑病、顆粒球減少、血小板減少、血小板機能低下（出血時間の延長）
皮膚 ^{注1)}	脱毛、結節性紅斑
過敏症 ^{注1)}	発疹、痒疹、蕁麻疹、脈管炎
感覚器	結膜炎、耳鳴、角膜混濁 ^{注3)} 、網膜障害 ^{注3)} 、眼窩及びその周囲の疼痛、難聴
肝臓	肝機能異常（AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇等）
精神神経系 ^{注4)}	頭痛、眠気、めまい、抑うつ、不眠、知覚異常、脱力感、ふらつき感、疲労、神経過敏、不安、離人症、振戦、失神、末梢神経炎
循環器	動悸、血圧上昇
その他	浮腫、不快、発汗亢進、ほてり、鼻出血、頻尿、尿糖、高血糖、胸痛

注1) 症状があらわれた場合には投与を中止すること。

注2) 血液検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止すること。

注3) 関節リウマチ患者等に長期連用して、前駆症状（霧視等の視覚異常）があらわれた場合には直ちに投与を中止すること。

注4) 症状が激しい場合及び減量しても消失しない場合には投与を中止すること。

(5) 高齢者への投与

高齢者では、副作用があらわれやすいので、少量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。（「(2) 重要な基本的注意」の項参照）

(6) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。妊娠中の投与に関し次のような報告がある。

ア. 妊娠末期に投与したところ、胎児循環持続症（PFC）、胎児の動脈管収縮、動脈管閉存症、胎児腎不全、胎児腸穿孔、羊水過少症が起きたとの報告がある。また、妊娠末期に投与したところ早期出産した新生児に壊死性腸炎の発生率が高いとの報告、及び消化管穿孔、頭蓋内出血が起きたとの報告がある。^{5) 6) 7) 8)}

イ. 動物実験（マウス）で催奇形作用が報告されている。⁹⁾（参考）

マウス胎児の器官形成期にインドメタシン 10mg/kgを単回経口投与、又は7.5mg/kg/日を9日間連続経口投与した催奇形性試験において、外形及び骨格の異常が認められた。

2) 本剤投与中は授乳を中止させること。[母乳中へ移行することが報告されている。]⁹⁾

(7) 小児等への投与

他剤が無効又は使用できない関節リウマチの場合にのみ本剤の投与を考慮するとともに、投与する場合には必要最小限の使用にとどめるなど、慎重に投与すること。[小児に対する安全性は確立されておらず、また、経口投与時の小児で大量投与により、重篤な副作用（感染症の不顕性化、肝炎）が報告されている。]

(8) 過量投与

痙攣、錯乱、失見当識等が認められた場合には、症状に応じ支持療法、対症療法を行う。なお、本剤は透析では除去されないとの報告がある。

(9) その他の注意

- 1) 動物実験（マウス）でレンチナンとの併用により、消化管潰瘍、消化管穿孔があらわれたとの報告がある。
- 2) 非ステロイド性消炎鎮痛剤を長期間投与されている女性において、一時的な不妊が認められたとの報告がある。

※※【薬効薬理】¹⁰⁾


酸性非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）。炎症のケミカルメディエーターであるプロスタグランジン（PG）の生合成を阻害することによって抗炎症作用を現す。PGは細胞膜の構成脂質であるアラキドン酸から生合成され、その律速酵素はシクロオキシゲナーゼ（COX）であるが、NSAIDsのPG生合成阻害機序はこのCOXの阻害である。また、組織の損傷が起こると発痛物質であるブラジキニンの発痛作用を増強すると考えられる。従って、NSAIDsによりPGの産生が阻害されれば、鎮痛効果が得られることになる。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：インドメタシン（Indometacin）

化学名：[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1*H*-indol-3-yl]acetic acid

化学構造式：



分子式：C₁₉H₁₆ClNO₄

分子量：357.79

性状：インドメタシンは白色～淡黄色の微細な結晶性の粉末である。メタノール、エタノール(95)又はジエチルエーテルにやや溶けにくく、水にほとんど溶けない。水酸化ナトリウム試液に溶ける。また、光によって着色する。

融点：155～162℃

【包装】

インドメタシン坐剤シオエ 12.5 100個

インドメタシン坐剤シオエ 25 100個

インドメタシン坐剤シオエ 50 50個

※※【主要文献】

- 1) Maiche, A. G. : Lancet, June(14), 1390(1986)
- 2) Walden, R. J. et al. : Br. J. Clin. Pharmacol., 33, 241(1992)
- 3) Conlin, P. R. et al. : Hypertension, 36(3), 461(2000)
- 4) Boiskin, I. et al. : Annals of Internal Medicine, 106, 776(1987)
- 5) Hallak, M. et al. : Obstet. Gynecol., 78(5), 911(1991)
- 6) Norton, M. E. et al. : N. EngJ. Med., 329, 1602 (1993)
- 7) Carol, A. M. et al. : Am. J. Obstet Gynecol, 170, 102 (1994)
- 8) Fejgin, M. D. et al. : American J. P., 11, 295(1994)
- 9) 草薙隆夫 他：先天異常, 17, 177(1977)
- 10) 第十六改正日本薬局方解説書(廣川書店)

文献請求先：シオエ製薬株式会社 学術情報部
〒661-0976
兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号
TEL 06(6470)2102
FAX 06(6499)8132

製造販売元  **シオエ製薬株式会社**
兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号
販売  **日本新薬株式会社**
京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14