

貯法：室温保存

有効期間：5年

漢方製剤

承認番号

16200AMY00397000

販売開始

1988年10月

TY-043

〔東洋〕<sup>ごれいさんりょう</sup>五苓散料エキス細粒

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

販売名	〔東洋〕五苓散料エキス細粒
有効成分	本剤1日量（6.0g）中、下記の混合生薬より抽出した五苓散料の水製エキス3.0gを含有する。 日局タクシヤ・・・5.0g 日局チヨレイ・・・3.0g 日局ビヤクジュツ・3.0g 局外生規ケイシ・・・2.0g 日局ブクリョウ・・・3.0g
添加剤	トウモロコシデンプン（賦形剤）

## 3.2 製剤の性状

剤形	細粒剤
色調	褐色
識別コード	TY-043
におい	特異な臭い
味	やや苦い

## 4. 効能又は効果

のどが渇いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：  
水瀉性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ

## 6. 用法及び用量

通常1日3回 1回2.0g（1包）を空腹時経口投与  
年令、症状により適宜増減する。

## 8. 重要な基本的注意

- 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

## 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

## 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

## 9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

## 9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

## 11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、発赤、痒痒等
肝臓	肝機能異常（AST、ALT、 $\gamma$ -GTP等の上昇）

## 20. 取扱い上の注意

- 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
- 本剤は生薬を原料としているので、色調、味、においが異なることがある。

## 22. 包装

500g [ボトル]  
2.0g×252包 [分包]

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

株式会社東洋薬行  
〒113-0033 東京都文京区本郷6-19-7  
TEL 03-3813-2263  
FAX 03-3813-0202

## 26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元  
株式会社東洋薬行  
東京都文京区本郷6-19-7