

500mL

去痰剤

アンモニア・ウイキョウ精「マルイシ」

Foeniculated Ammonia Spirit「Maruishi」

日本薬局方

アンモニア・ウイキョウ精

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500mL

アンモニア・ウイキョウ精「マルイシ」

* 2009年7月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	872232
承認番号	16100AMZ00990
薬価収載	1955年9月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1981年8月

貯 法：室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

* ●**禁忌**(次の患者には投与しないこと)
ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者(「1.相互作用」の項参照)

●**組成・性状**

1.組成

100mL中 アンモニア水 17mL
ウイキョウ油 3mL
及び添加物としてエタノール 含有。

2.性状

無色～黄色の液で、特異なおいがあり、味はわずかに甘く、舌をさすようである。
比重 d_{20}^{20} ：約0.85

●**効能・効果**

下記疾患に伴う喀痰喀出困難
急性気管支炎、慢性気管支炎、感冒・上気道炎

●**用法・用量**

通常、成人1日2mLを数回に分割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

* ●**使用上の注意**

1.相互作用

(1)併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム(ノックピン)、シアナミド(シアナミド)、カルモフル(ミフロール)、プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

(2)併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質(セフェノキシム塩酸塩、セフォペラゾンナトリウム、セフミノクスナトリウム水和物、セフメタゾールナトリウム、ラタモキセフナトリウム)、メロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

長期・大量投与：

胃に障害があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止すること。

3.適用上の注意

本剤は引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。

製造番号

使用期限

火気厳禁

アルコール類
水 溶 性
危険等級Ⅱ



キャップ：PP
中 栓：PE

ガラス：瓶

GS1-RSS



(01)14987211105515

JAN



4