

貯 法： 室温保存

有効期間： 3年

止しゃ剤

承認番号 16100AMZ02397

販売開始 1986年4月

# 日本薬局方 タンニン酸アルブミン

## タンニン酸アルブミン「メタル」

### Albumin Tannate

#### 2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 出血性大腸炎の患者[腸管出血性大腸菌(0157等)や赤痢菌等の重篤な細菌性下痢患者では、症状の悪化、治療期間の延長をきたすおそれがある。][9.1.1参照]
- 2.2 牛乳アレルギーのある患者[ショックまたはアナフィラキシーを起こすことがある。]
- 2.3 本剤に対し過敏症の既往歴のある患者[本剤投与により過敏症状があらわれることがある。][11.1.1参照]
- 2.4 経口鉄剤を投与中の患者[10.1参照]

#### 3. 組成・性状

##### 3.1 組成

販売名	タンニン酸アルブミン「メタル」
有効成分	1g中 タンニン酸アルブミン(日局) 1g タンニン酸とタンパク質との化合物である。 タンパク質の基原は乳性カゼインである。

##### 3.2 製剤の性状

販売名	タンニン酸アルブミン「メタル」
性状	淡褐色の粉末で、においはないか、又は僅かに特異なにおいがある。

#### 4. 効能又は効果

下痢症

#### 6. 用法及び用量

タンニン酸アルブミンとして通常、成人1日3~4gを3~4回に分割経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

#### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

##### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

###### 9.1.1 細菌性下痢の患者

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しない。治療期間の延長をきたすおそれがある。[2.1参照]

##### 9.3 肝機能障害患者

肝障害を悪化させるおそれがある。

#### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

#### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

#### 9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

#### 10. 相互作用

##### 10.1 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
経口鉄剤 (フェロミア、フェロ・グラデュメット、インクレミンシロップ、フェルムカプセル) [2.4参照]	相互に作用が減弱することがあるの で、併用しないこ と。	鉄と結合し、タンニン酸鉄となり、タンニン酸による収れん作用が減弱する。

##### 10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ロペラミド塩酸塩	ロペラミド塩酸塩の効果が減弱するおそれがあるの で、投与間隔をあける など併用に注意す ること。	本剤がロペラミド塩酸塩を吸着することが考えられる。

#### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

##### 11.1 重大な副作用

###### 11.1.1 ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)

呼吸困難、蕁麻疹、顔面浮腫等の過敏症状あるいは気管支喘息発作等の症状が発現することがある。[2.3参照]

##### 11.2 その他の副作用

	頻度不明
長期・大量投与	肝障害
消化器	便秘、食欲不振

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 アルカリにより分解する。

14.1.2 抱水クロラールやヨウ化物と混合すると湿潤する。

## 16. 薬物動態

### 16.2 吸収

膵液によってタンニン酸とアルブミンに分解され、タンニン酸は更に加水分解をうけて没食子酸とブドウ糖になり吸収される。

### 16.4 代謝

経口投与後、口腔、胃では分解を受けず、膵液により腸管内で徐々に分解しタンニン酸を遊離する。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

本剤はタンニン酸がアルブミンと結合し、かつ加熱して硬化処理をほどこしてあるため、水に溶解せず、口腔、胃ではタンニン酸による収れん作用が現れない。腸に至って初めて膵液により徐々に分解してタンニン酸を遊離し、全腸管にわたって緩やかな収れん作用を及ぼし止瀉作用を示す<sup>1)</sup>。

## 20. 取扱い上の注意

開封後は、遮光して保存すること。

## 22. 包装

500g (アルミ袋)

## 23. 主要文献

1) 第十八改正日本薬局方解説書 廣川書店. 2021:C-3161-3164

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

中北薬品株式会社 製薬工場事業部  
〒496-0016 愛知県津島市白浜町字番場52-1  
TEL 0567-32-1431  
FAX 0567-32-2961

## 26. 製造販売業者等

### 26.1 製造販売元

 **中北薬品株式会社**  
愛知県津島市白浜町字番場52-1