



蜂

印

Diastase

日本薬局方

ジアスターゼ

\*\*ジアスターゼ〈ハチ〉

使用期限

500g

製造番号

販売

小野薬品工業株式会社

大阪市中央区久太郎町1丁目8番2号

製造販売

東洋製薬化成株式会社

大阪市鶴見区鶴見2丁目5番4号



\*\*2015年 3月改訂(第5版)

\*2012年 4月改訂

日本標準商品分類番号	
872331	
承認番号	(61AM)3166
薬価収載	1986年3月
販売開始	1986年3月
再評価結果	1983年4月

貯法：気密容器、

30℃以下

使用期限：ラベルに表示(3年)

健胃消化剤

禁忌(次の患者には投与しないこと)  
本剤に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

1. 組成

1g中 日本薬局方ジアスターゼ  
1g含有。

2. 性状

淡黄色～淡褐色の粉末である。  
吸湿性である。

【効能・効果】

主として炭水化物の消化異常症状  
の改善

【用法・用量】

ジアスターゼとして、通常成人1回  
0.3～0.5gを1日3回食後に経口投  
与する。

なお、年齢・症状により適宜増減  
する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用  
発現頻度が明確となる調査を实

施していない。

その他の副作用

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹等の過敏症状

注) このような場合には投与を中止  
すること。

【薬効薬理】

- 澱粉消化力は、 $\alpha$ ・ $\beta$ -アミラーゼ共同の作用と考えられる。
- 至適pHは弱酸性(4.5～5.5)である。

【有効成分に関する理化学的知見】

1. 一般名：ジアスターゼ
2. 性状：【組成・性状】2. 性状の項参照


【取扱い上の注意】

配合変化

- (1) 強酸又は強アルカリにより失活する。
- (2) 本剤は吸湿性が強いので配合による吸湿変化の原因となりやすい。

【文献請求先】

- 東洋製薬化成株式会社 医薬情報部  
\*〒533-0031  
\*大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号  
\*電話 0120-443-471



ガラス:瓶