

500g

苦味健胃剤

# センブリ・重曹散 「マルイシ」

Swertia and Sodium Bicarbonate Powder  
「Maruishi」

日本薬局方

## センブリ・重曹散

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

500g

MARUISHI

# センブリ・重曹散 「マルイシ」

製造番号

使用期限

&lt; 調剤包装専用コード &gt;



&lt; 非医療包装専用コード &gt;



A-3

500g

開封口

苦味健胃剤

# センブリ・重曹散 「マルイシ」

Swertia and Sodium Bicarbonate Powder  
「Maruishi」

日本薬局方

## センブリ・重曹散

* 2018年 2月改訂(第4版)
2014年12月改訂
日本標準商品分類番号 872333
承認番号 16100AMZ201010
業者収載 1967年7月
販売開始 1967年7月
再評価結果 1990年3月

貯蔵法：室温保存  
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)  
注意：本剤は原料に天然物が含まれておりますので、その産地や採取時期により製品の色調が一定しないことがあります。

- \* ● 禁忌(次の患者には投与しないこと)
  - (1)ナトリウム摂取制限を必要とする患者(高ナトリウム血症、浮腫、妊娠高血圧症候群等)[ナトリウムの貯留増加により、症状が悪化するおそれがある。]
  - (2)ヘキサンミンを投与中の患者(「2.相互作用」の項参照)

### ●組成・性状

- 1.組成
  - 100g 中 センブリ末 3g  
炭酸水素ナトリウム 70g  
及び添加物としてパレイショデンプン 含有。

- 2.性状  
淡灰黄色で、味は苦い。

- 効能・効果  
下記消化器症状の改善  
食欲不振、胃部不快感、胃もたれ、嘔気・嘔吐

- 用法・用量  
通常成人回0.5~1.0gを1日3回経口投与する。  
なお、年令、症状により適宜増減する。

### \* 使用上の注意

- 1.慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
  - (1)重症な消化管潰瘍のある患者[炭酸水素ナトリウムを配合しているため、症状が悪化するおそれがある。]
  - (2)腎障害のある患者[ナトリウム貯留による浮腫があらわれるおそれがある。]
  - (3)心不全、高血圧症の患者[ナトリウム過剰により、これらの症状が悪化するおそれがある。]
  - (4)肺機能障害のある患者[呼吸性アルカローシスになるおそれがある。]
  - (5)低クォリティアルカローシス等の電解質失調の患者[症状が悪化するおそれがある。]

### 2.相互作用

- \* (1)併用禁忌(併用しないこと)
 

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ヘキサンミン (ヘキサンミン 静注液)	本剤はヘキサンミン アルビドンとなり抗菌作用を発現 することがある。	ヘキサンミンは酸性尿中にホルム アルビドンとなり抗菌作用を発現 するが、本剤は尿のpHを上昇させ ヘキサンミンの効果を減弱させる。

- (2)併用注意(併用に注意すること)
  - 本剤は利尿作用等を有しているので、他の薬剤の吸収・排泄にも影響を与えることがある。

### 3.高齢者への投与

- 一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2