

2012年 4 月 作成（第1版）

貯 法：室温保存  
使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）  
注 意：取扱い上の注意参照  
規制区分：劇薬

|            |
|------------|
| 日本標準商品分類番号 |
| 87719      |

|       |               |
|-------|---------------|
| 承認番号  | 16000AMZ01932 |
| 薬価収載  | 1979年1月       |
| 販売開始  | 1979年1月       |
| 再評価結果 | 1982年8月       |

劇薬

# ヨウ素「ニッコー」

IODINE「NIKKO」

日本薬局方 ヨウ素

**【禁 忌】**（次の患者には使用しないこと）  
本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

## 【組成・性状】

### 1. 組 成

本品1g中 日局ヨウ素1g 含有。

### 2. 性 状

本品は灰黒色の板状または粒状の重い結晶で、金属性の光沢があり、特異なおいがある。

本品はジエチルエーテルに溶けやすく、エタノール(95)にやや溶けやすく、クロロホルムにやや溶けにくく、水に極めて溶けにくい。

本品はヨウ化カリウム試液に溶ける。

本品は常温で揮散する。

## 【効能・効果】【用法・用量】

ヨードチンキ、希ヨードチンキ、複方ヨード・グリセリン等の調剤に用いる。

## 【使用上の注意】

### 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

### 重大な副作用

アナフィラキシー様症状

アナフィラキシー様症状（呼吸困難、咽頭浮腫、喘鳴、蕁麻疹、潮紅等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。

## 【取扱い上の注意】

配合変化 アルカロイド、アルカリ、炭酸アルカリ、アンモニア、鉄、植物油、抱水クロラール、フェノール、チオ硫酸ナトリウム、タンニンなどと配合変化する。でんぷん含有物は青変する。

製造販売元  
日興製薬株式会社  
岐阜県羽島市江吉良町 1593