

【使用上の注意】

1.副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
皮膚(頻度不明):刺激感等があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。

2.適用上の注意

- (1)外用のみに使用すること。
- (2)原末又は溶解液が眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
- (3)結膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと。
- (4)深い創傷に使用する場合は希釈液としては注射用水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。

【薬効薬理】

本剤は有機物と接触して酸素を発生し、殺菌作用を示す。また本剤の還元によって生じたマンガンイオンは収れん作用があり、炎症を抑制するのに役立つ。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名:過マンガン酸カリウム (Potassium Permanganate)

分子式:KMnO₄ 分子量:158.03

性状:本品は暗紫色の結晶で、金属性光沢がある。本品は水に溶けやすい。本品の水溶液(1→1000)はやや甘みがあり、収れん性である。

【取扱い上の注意】

(配合禁忌)

- ① 有機物など酸化されやすい物質とは反応して沈殿を生じる。
- ② 過酸化水素によって分解される。

過マンガン酸塩類危険等級Ⅰ 可燃物接触注意 火気・衝撃注意

(0802)A

収れん・殺菌剤

日本薬局方 過マンガン酸カリウム

過マンガン酸カリウム 「ヤマゼン」

Potassium Permanganate "Yamazén"



製造販売元



山善製薬株式会社

大阪府中央区道修町2丁目2番4号

2008年2月改訂

貯法等:室温保存
気密容器

「取扱い上の注意」参照

日本標準商品分類番号 872614

承認番号 16000AMZ01619000

薬価基準収載

販売開始 1986年 2月

再評価結果 1983年 4月

【組成】

本品1g中、日局過マンガン酸カリウム1gを含有する。

【効能・効果】

下記の疾患及び状態における殺菌及び収れん
創傷、潰瘍、局所性多汗症及び臭汗症

【用法・用量】

0.01～0.1%液として用いる。



ラベル



容器:PE
キャップ:PE
外装フィルム:PVC

製造番号

使用期限

1.08.02

GST-RSS



4