



外用殺菌消毒剤

日本薬局方

イソプロパノール

ISOPROPANOL

イソプロパノール「ヤクハン」

月 日 開封

月 日 期限

調剤包装単位用バーコード表示品

パッケージデザイン変更品

使用期限

製造番号

500mL

火気厳禁

アルコール類
危険等級Ⅱ
水溶性

*2012年8月改訂(第5版) 貯 法 気密容器、火気を避けて保存
2008年2月改訂 使用期限 ラベルに記載

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜 【刺激作用がある。】

【組成・性状】本品1mL中 日局イソプロパノール1mL 含有。
本品は無色透明の液で、特異なおいがある。本品は水、メタノール、エタノール(95)又は
ジエチルエーテルと混和する。本品は燃えやすく、揮発性である。比重 d₂₀:0.785~0.788

【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

用法・用量 通常イソプロパノールとして50~70vol%液を用いる。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- (1) 眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。
- (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。【イソプロパノール蒸気に大量に又は
繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。】

2.副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過 敏 症 ^(注)	発疹等
皮 膚 ^(注)	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には
使用を中止すること。

3.臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

4.適用上の注意

(1)投与経路 外用にのみ使用すること。

- (2)使用時
- 1) 同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - 2) 本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
 - 3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
 - 4) 引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。

【取扱い上の注意】

*安定性試験:最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、
通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

*【文献請求先】日医工株式会社 お客様サポートセンター

〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21 ☎(0120)517-215 Fax(076)442-8948

日本標準商品分類番号

872615

承認番号 16000AMZ05358000

薬価収載 1985年12月

販売開始 1985年12月



JAN



調剤包装単位用



販売包装単位用

GS1



キャップ:PP

ガラス:ボトル

210054E

販売元
* 日医工株式会社
NICH-IKO 富山市総曲輪1丁目6番21

製造販売元
ヤクハン製薬株式会社
北海道北広島市北の里27番地