

【禁忌（次の患者及部位には使用しないこと）】

- (1) 本剤又は他の水銀剤に対し過敏症の既往歴のある患者
- (2) 臍帯ヘルニアの小児
- (3) 粘膜面
- (4) 口に触れる可能性のある部位（乳頭等）の消毒

医薬品コード 2619710X1018

【組成】

100mL中 日本薬局方 マーキュロクロム 2g 日本薬局方 精製水 適量

【効能又は効果】

皮膚表面の一般消毒、創傷・潰瘍の殺菌・消毒

【用法及び用量】

皮膚表面の一般消毒には2%液を、創傷、潰瘍の殺菌消毒には0.2～2%液を用いる。いずれも症状に応じ1日1～数回患者に適用する。

【使用上の注意】

1. 一般的注意

使用量はできるだけ必要最少量にとどめること。

2. 禁忌（次の患者及部位には使用しないこと）。  
前掲禁忌の欄御参照下さい。

3. 副作用

(1) ショック

まれにショックを起こすことがある。呼吸困難、血管浮腫（喉頭浮腫等）、蕁麻疹等のアナフィラキシー様症状を伴うことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、使用を中止するなど適切な処置を行うこと。



4 950498 143016

TRADE MARK



日本標準商品分類番号872619  
承認番号等（61AM）第2412号

外用用殺菌消毒剤  
薬価基準収載

日本薬局方

マーキュロクロム液

マーキュロクロム液「昭和」<sup>®</sup>

500mL

昭和製薬株式会社  
大阪府守口市南寺方東通1丁目4番12号

- (2) 過敏症  
発疹、蕁麻疹、痒痒、紅斑、小水疱等があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。
- (3) 長期・広範囲使用  
腎障害、骨髄抑制等の水銀中毒を起こすことがあるので、長期間又は広範囲に使用しないこと。
4. 適用上の注意  
(1) 外用にのみ使用すること。  
(2) 眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。  
(3) 深い創傷に使用する場合の希釈液としては、注射用蒸留水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。  
(4) 希釈する水に、アルカリ土類金属塩、重金属塩、第二鉄塩、酸類、ヨウ素等が存在する場合、変化することがあるので注意すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手に届かないところに保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、高温の場所に保管しないこと。
- (3) 他の容器に入れないこと。

【文献及び文献請求先】

文献 日本薬局方解説書  
医療用医薬品再評価結果（No.38）  
文献請求先 大阪府守口市南寺方東通1丁目4番12号  
昭和製薬株式会社 医薬品製造管理係

平成10年2月改定