



亜鉛華デンプン
「ケンエー」
Zinc Oxide Starch Powder
500g
日本薬局方
外用局所収れん剤

外用局所収れん剤
日本薬局方

亜鉛華デンプン
亜鉛華デンプン「ケンエー」

Zinc Oxide Starch Powder

500g

外用局所収れん剤
日本薬局方

亜鉛華デンプン
亜鉛華デンプン「ケンエー」

Zinc Oxide Starch Powder

500g

〔使用上の注意〕

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)過敏症：過敏症状（頻度不明）があらわれた場合には使用を中止すること。

(2)皮膚：発疹、刺激感（頻度不明）等の症状があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

(1)投与経路：眼には使用しないこと。

(2)使用時：誤って吸入しないよう注意させること。

〔取扱い上の注意〕

〈注意〉

空気中から二酸化炭素を吸収して変質しやすいので注意すること。

製造番号

使用期限



外用局所収れん剤
日本薬局方

亜鉛華デンプン
亜鉛華デンプン「ケンエー」

Zinc Oxide Starch Powder

500g

貯法：密閉容器
室温保存
注意：「取扱い上の注意」
の項参照

※ 2003年5月改訂（第2版）
2000年10月作成

日本標準商品分類番号 872621

承認番号	薬価収載	販売開始	再評価結果
(61AM)1239		1986年3月	1979年2月

〔禁忌（次の部位には使用しないこと）〕

(1)重度又は広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。〕

(2)患部が湿潤している場合〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。〕

※〔組成・性状〕

〈組成〉 100g中

日局酸化亜鉛 50g含有。

添加物としてパレイショデンプンを含有する。

〈性状〉

白色の粉末である。

〔効能・効果〕

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐

湿疹・皮膚炎、汗疹、間擦疹、日焼け

〔用法・用量〕

通常、症状に応じ、1日1～数回、綿などに含ませて軽く散布して用いる。

GS1-RSS



(01)14987286205516

JAN



4 987286 205519



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626