

500g

収斂・消炎・保護剤

亜鉛華デンプン「マルイシ」

Zinc Oxide Starch Powder 「Maruishi」

日本薬局方

亜鉛華デンプン

製造番号

使用期限

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2



500g

亜鉛華デンプン「マルイシ」

収斂・消炎・保護剤

亜鉛華デンプン「マルイシ」

Zinc Oxide Starch Powder 「Maruishi」

開封口

日本薬局方

亜鉛華デンプン

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

亜鉛華デンプン「マルイシ」 500g

2014年12月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16100AMZ00988
薬価収載	1955年9月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1979年2月

貯法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

注意：空気中から二酸化炭素を吸収して変質する。

●禁忌(次の部位には使用しないこと)

- (1)重度又は広範囲の熱傷[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]
(2)患部が湿潤している場所[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]

●組成・性状

1.組成

酸化亜鉛 50%
及び添加物としてバレイショデンプン 含有。

2.性状

白色の粉末である。

●効能・効果

下記の皮膚疾患の取れん・消炎・保護・緩和な防腐
湿疹・皮膚炎、汗疹、間擦疹、日焼け

●用法・用量

通常、症状に応じ1日1～数回、綿などに含ませて
軽く散布して用いる。

●使用上の注意

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確
となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^(注)	過敏症状
皮膚 ^(注)	発疹、刺激感等

(注)このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

2.適用上の注意

使用部位：眼には使用しないこと。

使用時：誤って吸入しないよう注意させること。