

2012年 1 月 作成（第1版）

貯 法：室温保存
使用期限：3 年（表示の使用期限を参照すること。）

日本標準商品分類番号
872649

承認番号	16100AMZ01291
薬価収載	1979年1月
販売開始	1979年1月
再評価結果	1979年2月

収斂・消炎・保護剤

亜鉛華デンプン「ニッコー」

ZINC OXIDE STARCH POWDER「NIKKO」

日本薬局方 亜鉛華デンプン

【禁 忌】（次の部位には使用しないこと）

- 重度又は広範囲の熱傷
〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。〕
- 患部が湿潤している場合
〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。〕

【組成・性状】

- 組 成
本品 1g 中 日局酸化亜鉛 0.5g 及び 添加物としてバレイショデンプン 含有。
- 性 状
本品は白色の粉末である。

【効能・効果】

下記皮膚疾患の収斂・消炎・保護・緩和な防腐
湿疹・皮膚炎、汗疹、間擦疹、日焼け

【用法・用量】

通常、症状に応じ 1 日 1～数回、綿などに含ませて軽く散布して用いる。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^注	過敏症状
皮 膚 ^注	発疹、刺激感等

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

使用部位：眼には使用しないこと。
使 用 時：誤って吸入しないよう注意させること。

【取扱い上の注意】

注意
空気中から二酸化炭素を吸収して変質する。