

生薬製剤

マヤコウジン末

貯 法：室温保存
注意：「取扱い上の注意」の
項参照
使用期限：直接の容器及び外箱に表示

承認番号	(61AM)4647
薬価基準収載	1986年11月
販売開始	1986年11月

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- 重症高血圧症（収縮期血圧180mmHg以上）の患者
〔疾患及び関連症状が悪化するおそれがある。〕
- 体力の充実している患者で、不眠や煩燥症状のある患者
〔これらの症状が悪化するおそれがある。〕

【組成・性状】

- 組成
本品は、日本薬局方コウジンを粉末としたものである。
- 性状
本品は淡黄褐色～赤褐色を呈し、特異なおいがあり、味は初めわずかに甘く、後にやや苦い。

【効能・効果】

漢方処方調剤に用いる。

【用法・用量】

漢方処方調剤に用いる。

【使用上の注意】

- 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
 - 炎症症状（発熱等を含む）の著しい患者
 - 腎機能が低下し、浮腫や尿量減少のある患者
〔（1）（2）これらの症状が悪化するおそれがある。〕
 - 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
- | 種類/頻度 | 頻度不明 |
|--------------------|-------------------------|
| 過敏症 ^{注1)} | 発疹、蕁麻疹等 |
| 消化器 | 胃部不快感、消化不良、軟便、下痢等 |
| その他 | 鼻出血、顔面紅潮、体のほてり、血圧上昇、浮腫等 |
- 注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。
- 高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。
 - 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
 - 小児等への投与
小児等に対する安全性は確立していない。
〔使用経験が少ない。〕

6. その他の注意

人参の長期投与の結果、興奮、下痢、発疹、不眠、血圧上昇等があらわれたとの外国症例報告があり、長期大量投与は避けさせることが望ましい。¹⁾

【取扱い上の注意】

- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 本剤は天然の生薬を用いた製品ですので、製品により色調が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

【包 装】

500g

【主要文献】

1) Siegel, R. K. : J. Am. Med. Assoc. 241, 1614(1979)

＊ ＊ ＊

【文献請求先】

摩耶堂製薬株式会社 医薬部
〒651-2142 神戸市西区二ツ屋1-2-15
TEL 078-929-0066 FAX 078-929-1180



製造販売元

摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町居住65-1