

調剤用薬

日本薬局方

塩化ナトリウム

Sodium Chloride

塩化ナトリウム「ヤクハン」 (食 塩)

500g

GSI-RSS

(01)14987322130208

JAN

4 987322 130201

製造販売元

ヤクハン製薬株式会社

北海道北広島市北の里27番地
TEL&FAX 011-373-1097

日本標準商品分類番号	
87719	
承認番号等	16000AMZ04365000
薬価収載	1985年10月
販売開始	1985年10月
再評価結果	1977年10月

<貯法> 気密容器

開封 年 月

使用期限
有効期限

(食 塩)

「ヤクハン」塩化ナトリウム

塩化ナトリウム

日本薬局方

養由堂製

2008 年 6 月改訂（新バーコード表示に伴う改訂等）

【組成・性状】

1. 組 成

本品 1g 中、日局塩化ナトリウム (NaCl) 1g を含む。

2. 製剤の性状

本品は無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末である。

本品は水に溶けやすく、エタノール (99.5) にほとんど溶けない。

【効能・効果】 【用法・用量】

効能・効果	用法・用量
食塩喪失時の補給	塩化ナトリウムとして通常成人 1 回 1～2g をそのまま、または水に溶かして経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。
皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布 含嗽・噴霧吸入 剤として気管支粘膜 洗浄・喀痰排出 促進	① 通常、等張液として皮膚、創傷面、粘膜の洗浄、湿布に用いる。 ② 通常、等張液として含嗽、噴霧吸入に用いる。
医療用器具の洗浄	生理食塩液として医療用器具の洗浄に用いる。

【使用上の注意】

(経 口)

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 心臓、循環器系機能障害のある患者〔塩化ナトリウムを負荷することから心臓に負担をかけ、症状が悪化するおそれがある。〕
- (2) 腎障害のある患者〔塩化ナトリウムの過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。〕

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類・頻度	頻度不明
大量投与	悪心・嘔吐等の胃腸症状、 高ナトリウム血症、うっ血 性心不全、浮腫

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

塩化ナトリウム

塩化ナトリウム

「ヤクハン」

塩化ナトリウム

「ヤクハン」

330038F



外 箱



袋：PE