

[貯
法]直射日光を避け、また凍結しないよう室
温で保存してください。
[注
意]経時に沈降を起こすことがありますので、
使用前に強く振ってご使用ください。
[使用期間]18ヶ月
[使用期限]容器及び外箱に表示。使用期限内であ
っても、開封後はできるだけ速やかにご使用ください。

X線造影剤
処方箋医薬品 ネオダルムゾル

日本標準商品分類番号
877212
承認番号 14200AZZ06172000
裏面収載 1969年1月
販売開始 1969年1月
再評価結果 1982年1月

注意—医師等の処方箋により使用すること

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

- (1) 消化管の穿孔又はその疑いのある患者〔消化管外（腹腔内等）に漏れることにより、バリウム腹膜炎等の重篤な症状を引き起こすおそれがある。〕
- (2) 消化管に急性出血のある患者〔出血部位に穿孔を生ずるおそれがある。また、粘膜損傷部等より硫酸バリウムが血管内に侵入するおそれがある。〕¹⁾
- (3) 消化管の閉塞又はその疑いのある患者〔穿孔を生ずるおそれがある。〕
- (4) 全身衰弱の強い患者
- (5) 硫酸バリウム製剤に対し、過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

本品100mL中硫酸バリウム²⁾ 79gを含有する。

添加物：トラガント、CMC-Na、アラビアゴム末、メタリ
ン酸ナトリウム、デヒドロ酢酸ナトリウム、安息香
酸ナトリウム、パラベン、冰酢酸、シリコーン樹脂、
ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エ
ステル、エタノール、プロピレングリコール、香料

本品は白色又はわずかに帶黄色の粘稠性懸濁液で、酸味と香気を有する。

【効能・効果】

消化管（大腸）撮影

【用法・用量】

検査部位及び検査方法に応じ、本剤をそのまま又は本剤の適量に適量の水を加えて適當な濃度とし、その適量を注腸する。

通常成人は下記量を標準とする。

検査部位	検査方法	硫酸バリウム濃度(w/v%)	用量(mL)
大腸	（注 腸）	20～79	200～2000

【使用上の注意】

** 1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 消化管に瘻孔又はその疑いのある患者〔穿孔を生じ、消化管外に漏れるおそれがある。〕
- (2) 穿孔を生ずるおそれのある患者（胃・十二指腸潰瘍、虫垂炎、憩室炎、潰瘍性大腸炎、腸重積症、腫瘍、寄生虫感染、生体組織検査後間もない患者等）^{3)～8)}
- (3) 消化管の狭窄又はその疑いのある患者〔腸閉塞、穿孔等を生ずるおそれがある。〕
- (4) 腸管憩室のある患者〔穿孔、憩室炎を生ずるおそれがある。〕

** 2. 重要な基本的注意

- (1) 他の医薬品に対し過敏症の既往歴のある患者、喘息、アトピー性皮膚炎等過敏症反応を起こしやすい体质を有する患者では、ショック、アナフィラキシーがあらわれるおそれがあるので、投与に際しては問診を行い、観察を十分に行うこと。^{9), 10)}
- (2) 消化管内に硫酸バリウムが停留することにより、まれに消化管穿孔、腸閉塞、大腸潰瘍、大腸炎、憩室炎、バリウム虫垂炎等を引き起こすことが報告されており、特に高齢者においては、より重篤な転帰をたどることがあるので、次の点に留意すること。^{11)～13)}
 - 1) 患者の日常の排便状況に応じた下剤投与を行うこと。
 - 2) 迅速に硫酸バリウムを排出する必要があるため、十分な水分の摂取を患者に指導すること。
 - 3) 患者に排便状況を確認させ、持続する排便困難、腹痛等の消化器症状があらわれた場合には、直ちに医療機関を受診するよう指導すること。
 - 4) 腹痛等の消化器症状があらわれた場合には、腹部の診察や画像検査（単純X線、超音波、CT等）を実施し、適切な処置を行うこと。
- (3) 心臓に基礎疾患有する患者、高齢者では、不整脈・心電図異常があらわれることが報告されているので、観察に留意すること。^{14)～17)}

** 3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用（頻度不明）

- 1) ショック、アナフィラキシー：
ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、顔面蒼白、四肢冷感、血圧低下、チアノーゼ、意識消失、潮紅、荨麻疹、顔面浮腫、喉頭浮腫、呼吸困難等があらわれた場合には、適切な処置を行うこと。^{9), 10)}

2) 消化管穿孔、腸閉塞、腹膜炎：

消化管穿孔、腸閉塞、腹膜炎を引き起こすことがある。また、大腸潰瘍、大腸炎、憩室炎、バリウム虫垂炎等から消化管穿孔に至るおそれもあるので、観察を十分に行い、検査後、腹痛等の異常が認められた場合には、腹部の診察や画像検査（単純X線、超音波、CT等）を実施し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用 ^{9), 10), 11)}

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

	頻度 不明
消化器	排便困難、便秘、一過性の下痢・腹痛、肛門部痛・出血、恶心、嘔吐
過敏症	発疹、瘙痒感、荨麻疹

4. 高齢者への投与

高齢者では消化管運動機能が低下していることが多いため、硫酸バリウムの停留により、消化管穿孔が起こりやすく、また、起こした場合には、より重篤な転帰をたどることがあるので、検査後の硫酸バリウムの排泄については十分に留意すること。¹⁹⁾

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。また、本剤投与の際にはX線照射を伴うので、妊娠又は妊娠している可能性のある患者には、診断上の有益性が危険性を上まわると判断された場合にのみ投与すること。

6. 小児等への投与

新生児、低出生体重児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。(使用経験が少ない。)また、本剤投与の際にはX線照射を伴うので、小児等には、診断上の有益性が危険性を上まわると判断された場合にのみ投与すること。

7. 適用上の注意

投与後の処置：排便困難や便秘を防ぐため検査後、水分の摂取・下剤投与等の処置をすること。²⁰⁾

8. その他の注意

硫酸バリウム製剤が消化管損傷部等を介して組織内(腹腔、腸管、肺等)に停留した場合、肉芽腫を形成することがあるとの報告がある。^{21) ~23)}

【薬物動態】

吸収及び排泄：注腸により投与された硫酸バリウムは吸収されず、消化管を通じて糞便と共に、すべて体外に排泄される。

【有効成分に関する理化学的知見】²⁾

一般名：硫酸バリウム Barium Sulfate

分子式： BaSO_4 (Mw. 233. 39)

性状：白色の粉末で、におい及び味はない。水、エタノール(95%)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。塩酸、硝酸又は水酸化ナトリウム試液に溶けない。

【取扱い上の注意】

安定性試験：最終包装製品を用いた安定性試験の結果、本剤は通常の市場流通下において、使用期間の間安定であることが確認された。²⁴⁾

【包 装】

400mL×6本

*【主要文献】

- 1) Mari Takahashi et al : Internal Medicine, **43(12)**, 1145(2004)
- 2) 第16改正日本薬局方解説書, 廣川書店, C-5248(2011)
- 3) 及川司ほか : 岩手県立病院医学会雑誌, **24(1)**, 39(1984)
- 4) 三浦敏夫ほか : 外科, **43(5)**, 522(1981)
- 5) 多賀須幸男 : パンエンドスコピー, 医学書院, 99(1994)
- 6) 金子榮蔵ほか : Gastroenterol Endosc, **46(1)**, 54(2004)
- 7) 石原敬夫ほか : 外科治療, **18(2)**, 240(1968)
- 8) 加藤祐之助ほか : 大腸肛門誌, **29**, 4(1976)
- 9) 藤原和美ほか : 日内会誌, **72(7)**, 921(1983)
- 10) Javors BR et al : Gastrointest Radiol, **9**, 357(1984)
- 11) 田上鑑一郎ほか : 外科, **52(4)**, 410(1990)
- 12) 福井光昭ほか : Ther Res, **15(2)**, 343(1994)
- 13) 築野和男ほか : 日消外会誌, **23(11)**, 2673(1990)
- 14) MARTINDALE, **32nd**, 1003(1999)
- 15) Meyler's Side Effects of Drugs, **14th**, 1603(2000)
- 16) Eastwood GL : JAMA, **219(6)**, 719(1972)
- 17) 林亨ほか : 日消集検誌, **41(2)**, 75(2003)
- 18) 中沢勝子 : 印刷局医報, **21(1)**, 173(1975)
- 19) 仁科雅良ほか : 日消外会誌, **26(5)**, 1310(1993)
- 20) 新妻伸二 : 臨床放射線, **12(3)**, 248(1967)
- 21) 大原昌樹ほか : 香川県内科医会誌, **28**, 104(1991)
- 22) 山森積雄ほか : 臨外, **38(2)**, 277(1983)
- 23) Masayuki Shintaku et al : Acta Histochem, **18(6)**, 589(1985)
- 24) カイゲンファーマ株社内資料

*【文献請求先】

カイゲンファーマ株式会社 商品企画部 学術課

〒541-0045 大阪市中央区道修町二丁目 5番 14号

TEL 06(6202)8975

FAX 06(6202)0872