

速乾性擦り込み式手指消毒剤

ホエスミン[®]ラビング

Hoesmin[®] Rubbing

（ベンザルコニウム塩化物）

貯 法：遮光した気密容器に入れ、
火気を避けて保存
使用期限：3年
（容器に表示の使用期限内
に使用すること）

承認番号	20300AMZ00866
薬価収載	対象外
販売開始	1992年5月

【禁忌（次の部位には使用しないこと）】

損傷皮膚及び粘膜〔エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。〕

【組成・性状】

組成

販売名	ホエスミンラビング
成分・含量 (100mL中)	日局 ベンザルコニウム塩化物 200mg (0.2w/v%) (エタノール濃度は日局消毒用エタノールと同一)
添 加 物	無水エタノール、N-ココイル-L-アルギニンエチルエステルDL-ピロリドンカルボン酸塩、2-エチルヘキサン酸トリグリセリド

製剤の性状

本剤は無色澄明のエタノール含有外用液剤で、特異なおいがある。

本剤10mLは水3mL以下と混和するが、水の量を追加するとき白濁する。

比重 d_{20}^{20} : 0.860~0.870

【効能・効果】

医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒

【用法・用量】

(1)医療従事者の通常の手指消毒の場合

本剤約3mLを1回手掌にとり、乾燥するまで摩擦する。
ただし、血清、膿汁等の有機物が付着している場合は、十分に洗い落した後、本剤による消毒を行う。

(2)術前・術後の術者の手指消毒の場合

手指及び前腕部を石けんでよく洗浄し、水で石けん分を十分洗い落した後、本剤約3mLを手掌にとり、乾燥するまで摩擦し、更にこの本剤による消毒を2回繰り返す。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類	頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状（紅斑、そう痒感、浮腫等）	
皮膚 ^{注)}	刺激症状	

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

(1)使用部位

1) 損傷のある手指には使用しないこと。〔本剤はエタノールを含有するので、損傷部位への使用により刺激症状をあらわす。〕

2) 経口投与しないこと。

(2)使用時

1) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。

2) 眼に入った場合には、直ちに水洗すること。

3) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落してから使用すること。

4) 本剤で消毒した手指で、2.5kg以下の未熟児を取扱う場合、未熟児の皮膚がかぶれることがあるので十分注意すること。

【薬効薬理】

1) ホエスミンラビングはグラム陽性菌、グラム陰性菌、結核菌及び真菌類等に対して速やかな殺菌効果をあらわす。

2) 細菌の芽胞及び一部のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：〔日局〕ベンザルコニウム塩化物（Benzalkonium Chloride）
〔日局別名〕塩化ベンザルコニウム

化学名：Ammonium, alkylldimethyl (phenylmethyl)-, chloride

示性式：〔C₆H₅CH₂N(CH₃)₂R〕Cl

（RはC₈H₁₇~C₁₈H₃₇で、主としてC₁₂H₂₅及びC₁₄H₂₉からなる。）

性 状：本品は白色～黄白色の粉末又は無色～淡黄色のゼラチン状の薄片、ゼリー様の流動体若しくは塊で、特異なおいがある。

本品は水又はエタノール（95）に極めて溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

本品の水溶液は振ると強く泡立つ。

【包 装】

500mL 5L

※※【文献請求先】

ファイザー株式会社 製品情報センター
〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7
学術情報ダイヤル 0120-664-467
FAX 03-3379-3053

®登録商標

※製造販売元

マイラン製薬株式会社

大阪市中央区本町2丁目6番8号

※販売

ファイザー株式会社

東京都渋谷区代々木3-22-7

