



外皮用殺菌消毒剤

劇

ヤクハンヨウチン

使用期限

製造番号

500mL

製造販売元
ヤクハン製薬株式会社

北海道北広島市北の里27番地
TEL&FAX 011-373-1097



キャップ：PP

改訂年月 2008年3月 (新バーコード表示に伴う改訂) 日本標準商品分類番号 872612 承認番号等 13800AZZ00908000

劇薬、指定医薬品

(薬価基準未収載)

【禁忌】(次の患者には使用しないこと)

ヨード過敏症の患者

【組成・性状】

本品100mL中、日局ヨウ素6gを含む。添加物としてヨウ化カリウム4g、イソプロパノール30mLを含む。本品は暗褐色の液で、特異なおいがある。

【効能・効果】

皮膚表面の一般消毒、創傷・潰瘍の殺菌・消毒、歯肉及び口腔粘膜の消毒、根管の消毒

【用法・用量】

5～10倍に希釈し、1日2～3回患部及び皮膚に適量塗布する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	0.1%未満	頻度不明
過敏症 ^{注)}	ヨード疹等	——
皮膚 ^{注)}	——	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 臨床検査結果に及ぼす影響

血漿たん白結合ヨード(PBI)及び甲状腺放射性ヨード摂取率の検査値に影響を及ぼすことがある。

3. 適用上の注意

(1)投与経路 外用にのみ使用し、内服しないこと。

(2)使用時

- 1) 眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
- 2) 粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと。
- 3) 深い創傷に使用する場合は希釈液としては注射用水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水は用いないこと。
- 4) 同一部位に反復使用した場合には、表皮の剥離を伴う急性の皮膚炎を起こすことがあるので注意すること。
- 5) 口腔内に使用するときは、患部を乾燥させて塗布すること。

【取扱上の注意】

配合変化：マーキュロクロム液とは沈殿を生じる。

【貯法】 気密容器

GS1-RSS

(01)1498732230816

JAN

987322 230819

4

210858C