

※2008年2月改訂(第3版)

※2006年7月改訂

貯法：気密容器に入れ、火気を避けて保存

※使用期限：5年(表示の使用期限内に使用すること)

日本標準商品分類番号	872641
承認番号	16000AMZ06286
薬価収載	1950年9月
販売開始	1956年10月
再評価結果	1982年1月

【禁忌(次の患者には使用しないこと)】

本剤に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

組成：1mL中 日局サリチル酸メチル 1mL含有

性状：無色～微黄色の液で、強い特異なにおいがある。

エタノール(95)又はジエチルエーテルと混和する。水に極めて溶けにくい。

比重 d_{20}^{20} ：1.182～1.192

沸点：219～224℃

【効能・効果】

下記における鎮痛・消炎

関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫

【用法・用量】

5%又はそれ以上の濃度の液剤、軟膏剤又はリニメント剤として、皮膚局所に塗布する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発赤、発疹等
大量使用	頭痛、悪心・嘔吐、食欲不振、頻脈等

^{注)}このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

外用鎮痛・消炎剤

500mL

日本薬局方 サリチル酸メチル

サリチル酸メチル FM

Methyl Salicylate

第4類
第3石油類
危険等級III

火気厳禁

製造
番号

使用
期限



※発売元
※マイラン製薬株式会社
大阪市中央区本町2丁目6番8号

※製造販売元
株式会社 フジミ製薬所
大阪市東成区中本2丁目9番9号



2. 適用上の注意

使用時

眼には使用しないこと。

【薬効薬理】

外用により、局所刺激による血流の改善、鎮痛等の作用をあらわす。なお、経皮吸収され、尿中に排泄される。

※【学術情報に関するお問い合わせ先】

マイラン製薬株式会社 カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル 0120-06-6720
(9:00～17:00/土日祝日を除く)



ガラス:瓶

OYK