



**2014年 8月改訂（第4版）
*2008年 4月改訂

貯 法：室温保存
使用期限：容器、外箱に表示
注 意：取扱い上の注意の項参照

日本標準商品分類番号
873339

	ACD-A液
250mL	500mL
承認番号	15100EZZ00797
薬価収載	薬価基準未収載
販売開始	1995年9月 不明

生物学的製剤基準血液保存液A液
ACD-A液

【組成・性状】

〈成分・分量〉

有効成分	クエン酸ナトリウム水和物 クエン酸水和物 ブドウ糖	2.20 w/v% 0.80 w/v% 2.20 w/v%
------	---------------------------------	-------------------------------------

〈性状〉

性状	無色透明の液である。
pH	4.5~5.5

【効能又は効果】

血液保存

【用法及び用量】

血液量100mLにつき、本品15mLの割合で使用する。

【薬物動態】

(保存血液中の動態)

クエン酸水和物及びクエン酸ナトリウム水和物

クエン酸水和物及びクエン酸ナトリウム水和物は保存血液中では分解されず、輸血により全量が体内に投与される。体内では、血中から細胞外液へ拡散し、尿中への排泄あるいは肝臓で分解される。したがって、肝障害のある患者では血中クエン酸濃度が通常より上昇しやすい。

【取扱い上の注意】

〈使用前の注意〉

- 内容液が漏れている場合や、内容液に混濁・浮遊物等の異常が認められるときは使用しないこと。
- 排出口をシールしているフィルムがはがれているときは使用しないこと。

〈使用時の注意〉

- 使用時には排出口をシールしているフィルムをはすこと。
- 注射針は、無菌的操作により、ゴム栓の刻印部にまっすぐ刺通すること。斜めに刺すと、ゴム栓や排出口内壁の削り片が薬液中に混入したり、容器を刺通し液漏れの原因となったりすることがある。

** ● 薬剤を配合するときには、よく転倒混和し、配合変化に注意すること。

** 〈投与時の注意〉

- 本品に通気針（エア針）は不要である。

** ● 輸液セット等のびん針を接続する際は、ゴム栓の刻印部にまっすぐ刺通すること。

〈ソフトバッグの取扱い上の注意〉

- 本品は軟らかいプラスチックのバッグなので、鋭利なもの等で傷つけないこと。液漏れの原因となる。

* ● 包装袋より取り出したまま保管すると、内容液が蒸散する可能性があるので、速やかに使用するか包装袋に戻し封をすること。

** ● 容器の目盛りは目安として使用すること。

* 〈安定性試験〉

加速試験（40℃、相対湿度75%，6ヵ月）の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された¹⁾。

【包装】

250mL × 20袋
500mL × 20袋

* 〔主要文献〕

1) テルモ株式会社：500mLの安定性試験（社内資料）。

* 〔文献請求先〕

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

テルモ株式会社 コールセンター

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号

TEL 0120-12-8195

注) 処方箋医薬品：注意一医師等の処方箋により使用すること

 TERUMO®

製造販売元：テルモ株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号