

## 速乾性擦式手指消毒剤

# ウェルマッチ®エタノール液0.2%

WELLMATCH®

(クロルヘキシジン製剤)

### 【禁忌 (次の場合には使用しないこと)】

- (1) クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者
- (2) 膣、膀胱、口腔等の粘膜面 [クロルヘキシジン製剤の上記部位への使用により、ショック症状 (初期症状：悪心・不快感・冷汗・眩暈・胸内苦悶・呼吸困難・発赤等) の発現が報告されている。]
- (3) 損傷皮膚及び粘膜 [エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

### (2) その他の副作用

|                    | 頻度不明    |
|--------------------|---------|
| 過敏症 <sup>注1)</sup> | 発疹、蕁麻疹等 |
| 皮膚 <sup>注2)</sup>  | 刺激症状    |

注1) このような症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、再使用しないこと。

注2) このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

### 4. 適用上の注意

(1) **使用部位**：手指消毒以外の目的には使用しないこと。

(2) **使用時**：

- 1) 本剤の使用中に誤って眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。
- 2) 血清・膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分洗い落としてから使用すること。
- 3) 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落としてから使用すること。
- 4) 引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。

### 5. その他の注意

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与により、ショック症状を起こした患者のうち、数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

### 【臨床成績】<sup>1)</sup>

健康成人16名を対象とし、本剤 1 回 3 mL の手揉み洗浄による消毒前後の手指常在菌数の変化をグローブジュース法により検討した結果、その有効性が認められた。

### 【薬効薬理】<sup>1)</sup>

**ウェルマッチ エタノール液0.2%による各種細菌に対する殺菌効果**

ウェルマッチは黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、緑膿菌を含む 8 株－グラム陰性菌、グラム陽性菌を作用時間 5 秒で検出限界以下とした (*in vitro*)。

### ※※【組成・性状】

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| 販売名               | ウェルマッチ エタノール液0.2%                            |
| 成分・含量<br>(100mL中) | クロルヘキシジングルコン酸塩 0.2g<br>(0.2% $\wedge$ %) を含有 |
| 添加物               | エタノール、グルコン酸、トリイソオクタン酸グリセリン、ハアセチルしょ糖、ヒプロメロース  |
| 色・形状              | 無色澄明・液                                       |
| その他               | 特異なにおい                                       |

### 【効能・効果】

手指の消毒

### 【用法・用量】

本剤をそのまま用いる

### 【使用上の注意】

1. **慎重投与 (次の場合には慎重に使用すること)**

- (1) 薬物過敏症の既往歴のある者
- (2) 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある者

2. **重要な基本的注意**

- (1) ショック等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。
- (2) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。

3. **副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。(再審査対象外)

(1) **重大な副作用**

**ショック** (頻度不明)：ショックがあらわれることがあるので観察を十分に行い、悪心・不快感・冷汗・眩暈・胸内苦悶・呼吸困難・発赤等があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

## ※※【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：クロルヘキシジングルコン酸塩液  
(Chlorhexidine Gluconate Solution)

化学名：1, 1'-Hexamethylenebis[5-(4-chlorophenyl)-  
biguanide] di-D-gluconate

分子式： $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10} \cdot 2C_6H_{12}O_7$

分子量：897.76

構造式：



性 状：無色～微黄色の澄明な液で、においはなく、  
味は苦い。

水又は酢酸(100)と混和する。本品 1 mLはエ  
タノール(99.5) 5 mL以下又はアセトン 3 mL  
以下と混和するが、溶媒の量を増加すると  
き白濁する。

光によって徐々に着色する。

比重 $d_4^{20}$ ：1.06～1.07

## 【取扱い上の注意】

### ※※1. 安定性試験<sup>2)</sup>

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75  
%、6 ヲ月)の結果、本品は通常の流通下において  
3年間安定であることが推測された。

## 2. 注意

(1)本剤の付着した白布を次亜塩素酸ナトリウム等の塩  
素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミができること  
がある。漂白には過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白  
剤が適当である。

(2)本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれる  
と変色する場合があるので注意すること。

## 【包 装】

ウェルマッチ エタノール液0.2%：1 L

## 【主要文献】

- 1) 株式会社ポーラファルマ 社内資料
- 2) 株式会社ポーラファルマ 社内資料

## ※※【文献請求先】

株式会社ポーラファルマ 学術  
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17  
TEL 03-5436-2725  
FAX 03-5496-9718

※※製造販売元

株式会社 ポーラファルマ  
東京都品川区西五反田 8-9-5