

0.1%

外皮用殺菌消毒剤

滅菌製剤

日本薬局方

ベンザルコニウム塩化物液

0.1%  
ヤクゾール水

0.1% Yakuzol Water

使用期限

製造番号

500mL



製造販売元

ヤクハン製薬株式会社

北海道北広島市北の里 27 番地

TEL&amp;FAX 011-373-1097

キャップ: PP  
容器: PP  
キャップシール: PET

改訂年月 2008年8月 (新バーコード表示に伴う改訂等) 日本標準商品分類番号 872616 承認番号等 21100AMZ00588000

(薬価基準収載)

## 【組成・性状】

本品100mL中、日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 200mg(ベンザルコニウム塩化物として100mg)を含む。  
本品は無色澄明の液で、特異なおいがある。本品は振ると泡立つ。本品は滅菌製剤である。

## 【効能・効果】【用法・用量】

| 効能・効果                            | 用法・用量                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手指・皮膚の消毒                         | 通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、ベンザルコニウム塩化物0.05～0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で拭拭する。術前の手洗いの場合には5～10分間ブラッシングする。 |
| 手術部位(手術野)の皮膚の消毒                  | 手術前局所皮膚面をベンザルコニウム塩化物0.1%溶液で約5分間洗い、その後ベンザルコニウム塩化物0.2%溶液を塗布する。                                           |
| 手術部位(手術野)の粘膜の消毒<br>皮膚・粘膜の創傷部位の消毒 | ベンザルコニウム塩化物0.01～0.025%溶液を用いる。                                                                          |
| 感染皮膚面の消毒                         | ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。                                                                                |
| 医療機器の消毒                          | ベンザルコニウム塩化物0.1%溶液に10分間浸漬するか、または厳密に消毒する際は、器具を予め2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後ベンザルコニウム塩化物0.1%溶液中で15分間煮沸する。          |
| 手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒             | ベンザルコニウム塩化物0.05～0.1%溶液を布片で塗布・拭拭するか、または噴霧する。                                                            |
| 壁洗浄                              | ベンザルコニウム塩化物0.02～0.05%溶液を用いる。                                                                           |
| 結膜囊の洗浄・消毒                        | ベンザルコニウム塩化物0.01～0.05%溶液を用いる。                                                                           |

## 【使用上の注意】

## 1. 重要な基本的注意

- (1) 本剤は濃度に注意して使用すること。
- (2) 炎症又は易刺激性の部位(粘膜、陰股部等)に使用する場合に、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
- (3) 原液が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。
- (4) 深い創傷又は眼に使用の場合は、精製水を使用して調製後滅菌処理すること。

## 2. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

過敏症 発疹、痒痒感等の過敏症状(頻度不明)があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。

## 3. 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤で消毒したカテーテルで採取した尿はスルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。

## 4. 適用上の注意

- (1) 投与経路 1) 経口投与しないこと。  
2) 洗眼には使用しないこと。
- (2) 使用時 1) 皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。  
2) 粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと。【全身吸収による筋脱力を起こすおそれがある。】  
3) 密封包帯、ギプス包帯、バグクに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。

## 5. その他の注意

- (1) 血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落してから使用すること。
- (2) 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落してから使用すること。
- (3) 繊維、布(綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等)は本剤の成分であるベンザルコニウム塩化物を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下とならないように注意すること。
- (4) 皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。
- (5) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等への使用は避けることが望ましい。

## 【薬効薬理】

本品はグラム陽性、陰性菌のみならず、芽胞のない細菌やカビ類といった真菌類に対しても殺菌作用を有する。しかし、結核菌及び大部分のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

## 【取扱上の注意】

1. 本剤は滅菌製剤なので、開封後は直ちに使用すること。
2. 開封後の残液を再使用する場合は、改めて滅菌すること。
3. 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐食を防止するためにベンザルコニウム塩化物0.1%溶液に0.5～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。
4. 皮革製品の消毒に使用すると、変質させることがあるので、使用しないこと。

&lt;貯法&gt; 気密容器

0.1%  
ヤクゾール水

GS1-RSS

(01)14987322513049

JAN

987322513042

4

212748H