

NIKKO

外用殺菌消毒剤

フェノール水 「ニッコー」

PHENOLATED WATER「NIKKO」

日本薬局方 フェノール水

500mL

2015年 4月 改訂 (第2版)	
2010年 8月 作成	
日本標準商品分類番号	872619
承認番号	16100AMZ01316
薬価収載	1979年1月
販売開始	1979年1月
再評価結果	1982年8月

貯法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

製造販売元



日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

【禁 忌】(次の部位には使用しないこと)

損傷皮膚及び粘膜[吸収され、中毒症状を起こすおそれがある。]

【組成・性状】

1. 組 成

本品100mL中 日局液状フェノール2.2mL含有。
[フェノール(C₆H₆O) 1.8~2.3%含有。]

2. 性 状

本品は無色澄明の液で、フェノールのにおいがある。

【効能・効果】【用法・用量】

1. 手指・皮膚の消毒

フェノールとして1.5~2%溶液を用いる。(本品をそのまま用いる)

2. 医療機器、手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒
フェノールとして2%溶液を用いる。(本品をそのまま用いる)

3. 痒疹(小児ストロフルスを含む)、じん麻疹、虫さされの
鎮痒

フェノールとして1~2%溶液を用いる。(本品を1~2倍に希釈して用いる)

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

(1) 眼に入らないように注意すること。入った場合には
水でよく洗い流すこと。

(2) 本剤を希釈する場合は、濃度に注意して使用すること。

(3) 炎症又は易刺激性の部位に使用する場合には、濃度
に注意して正常の部位に使用するよりも低濃度とす
ることが望ましい。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調
査を実施していない。

その他の副作用

過敏症 発疹等(頻度不明)の過敏症状があらわれること
があるので、このような場合には使用を中止す
ること。

3. 適用上の注意

(1) 人体

投与経路：外用にのみ使用すること。

使用時：

ア.密封包帯、ギプス包帯、バックに使用すると刺激
症状及び吸収され、中毒症状があらわれるおそれ
があるので、使用しないこと。

イ.長期間又は広範囲に使用しないこと。[吸収され、
中毒症状を起こすおそれがある。]

ウ.誤飲を避けるため、保管及び取扱いには十分注意
すること。

(2) その他

ア.金属器具を長時間浸漬する必要がある場合は、腐
蝕を防止するために0.5~1.0%の亜硝酸ナトリ
ウムを添加すること。

イ.合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、
塗装力テール等には変質するものがあるので、
このような器具は長時間浸漬しないこと。

【薬効薬理】

本剤は、使用濃度においてグラム陽性菌、グラム陰性菌、
結核菌には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び
大部分のウイルスに対する効果は期待できない。



キャップ：PP

ガラス：瓶

製造番号

使用期限

〈調剤包装単位用コード〉
0010498729126111

〈販売包装単位用コード〉
0014987291861110