

商品番号 TM-23

トウ キ シャクヤク サンリョウ

当帰芍薬散料エキス顆粒T

医療用漢方製剤（調剤用）

承認番号	(61AM) 4207
薬価収載	1986年10月
販売開始	1987年 4月

貯 法：室温保存 本剤は吸湿性が高いので、開封後は特に吸湿に注意すること。
他の保管条件については【取扱い上の注意】の項参照

使用期限：外箱等に表示。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【組成・性状】

＊＊1.組成

本品7.5 g 中、下記の割合の混合生薬の水製乾燥エキス〔日局 当帰芍薬散（トウキシャクヤクサン）エキス〕3.67 g を含有する。

日局	シャクヤク		6.0 g
日局	ブクリョウ		4.0 g
日局	ビャクジュツ		4.0 g
日局	タクシャ		4.0 g
日局	トウキ		3.0 g
日局	センキュウ		3.0 g

添加物として、乳糖水和物、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

2.製剤の性状

(1)顆粒の性状

- 1)外観は、淡黄褐色～褐色の顆粒である。
- 2)特異なおいがあり、味はわずかに甘く、後に苦味が残る。

(2)分包品の表示

識別コード：TM-23

【効能・効果】

比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすい、ときに下腹部痛、頭痛、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ

【用法・用量】

通常、成人1日7.5 g を2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1.慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1)著しく胃腸の虚弱な患者〔食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢等があらわれることがある。〕
- (2)食欲不振、悪心、嘔吐のある患者〔これらの症状が悪化するおそれがある。〕

2.重要な基本的注意

- (1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

3.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 ⁽¹⁾	発疹、そう痒等
* 肝臓	肝機能異常（AST（GOT）、ALT（GPT）等の上昇）
消化器	食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢等

注）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

4.高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

5.妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

6.小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない〕

【取扱い上の注意】

本品は吸湿しやすいので、分包に際しては防湿性に優れた分包フィルムを使用すること。

【包 装】

300包（1包2.5 g）

【文献請求先】

東亜薬品株式会社 安全管理部
〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10

発売元

 株式会社 陽進堂
富山県富山市婦中町秋島3697番地8号

製造販売元

 東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10