

＊ ＊ 2012年 4月改訂（第3版）
＊ 2005年 4月改訂

日本標準商品分類番号
875200

商品番号 TM-40

チョレイトウ

猪苓湯エキス顆粒T

医療用漢方製剤（調剤用）

承認番号	(62AM) 0061
薬価収載	1987年10月
販売開始	1987年10月

貯 法：室温保存 本剤は吸湿性が強いので、開封後は特に吸湿に注意すること。
他の保管条件については【取扱い上の注意】の項参照
使用期限：外箱等に表示。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【組成・性状】

＊ ＊ 1. 組成

本品9.0 g中、下記の割合の混合生薬の水製乾燥エキス〔猪苓湯（チョレイトウ）乾燥エキス〕3.63 gを含有する。

日局	チョレイ	……………	3.0 g
日局	ブクリョウ	……………	3.0 g
日局	カッセキ	……………	3.0 g
日局	タクシャ	……………	3.0 g
	アキョウ	……………	3.0 g

添加物として、乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

2. 製剤の性状

(1) 顆粒の性状

- 1) 外観は、帯褐白色～淡黄白色の顆粒である。
- 2) 特異なおいがあり、味は甘い。

(2) 分包品の表示

識別コード：TM-40

【効能・効果】

尿量が減少し、尿が出にくく、排尿痛あるいは残尿感のあるもの

【用法・用量】

通常、成人1日9gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 ^(注)	発疹、発赤、そう痒等
消化器	胃部不快感等

注) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

5. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

【取扱い上の注意】

本品は吸湿しやすいので、分包に際しては防湿性に優れた分包フィルムを使用すること。

【包装】

300包（1包3.0g）

【文献請求先】

東亜薬品株式会社 安全管理部
〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10

＊ 発売元

 株式会社 陽進堂
富山県富山市婦中町秋島3697番地8号

＊ 製造販売元

 東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10