

商品番号 TM-15

オウレンゲドクトウ
黄連解毒湯エキス顆粒T
医療用漢方製剤

承認番号	(61AM)4209
薬価収載	1987年10月
販売開始	1987年10月

貯法：室温保存 本剤は吸湿性が強いので、開封後は特に吸湿に注意すること。
他の保管条件については【取扱上の注意】の項参照
使用期限：外箱等に表示。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【組成・性状】

1. 組成

本品7.5g中、下記の割合の混合生薬の水製乾燥エキス〔黄連解毒湯（オウレンゲドクトウ）乾燥エキス-A〕1.6gを含有する。

日局 オウゴン	3.0g
日局 オウレン	2.0g
日局 オウバク	2.0g
日局 サンシシ	2.0g

2. 製剤の性状

(1) 顆粒の性状

- 1) 外観は、淡黄褐色～褐色の顆粒である。
- 2) ほとんどにおいがなく、味は極めて苦い。

(2) 分包品の表示

識別コード：TM-15

【効能又は効果】

比較的体力があり、のぼせがみで顔色赤く、いらいらする傾向のある次の諸症：鼻出血、不眠症、ノイローゼ、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、どうき

【用法及び用量】

通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。
なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

※※【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

著しく体力の衰えている患者〔副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。〕

2. 重要な基本的注意

※(1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

(2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

<重大な副作用>

間質性肺炎：発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常（捻髪音）等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。

<その他の副作用>

(1)過敏症：発疹、蕁麻疹等があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

(2)肝臓：GOT、GPT、Al-P、γ-GTP、ビリルビンの上昇等があらわれることがある。

(3)消化器：食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢等があらわれることがある。

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない。〕

【取扱上の注意】

本剤は吸湿しやすいので、分包に際しては防湿性に優れた分包フィルムを使用すること。

【包装】

500g
300包（1包2.5g）

※※【主要文献及び文献請求先】

<文献請求先>

東亜薬品株式会社 学術情報室
〒939-3542 富山市水橋開発277番10

製造元

TOA 東亜薬品株式会社
富山市三郷26番地