

オースギ

2008年4月改訂(第3版)
日本標準商品分類番号875200
承認番号15700AMZ00378
薬価収載 1984年6月
販売開始 1987年10月
使用期限 表示の使用期限に注意すること。

紫雲膏「マルイシ」

〔禁忌(次の場合には使用しないこと)〕

- 1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2) 重度(重症)の熱傷・外傷のある患者
- 3) 化膿性の創傷で高熱のある患者
- 4) 患部の湿潤やただれのひどい患者

[2)~4):これらの症状が悪化するおそれがある。]

〔組成・性状〕

1) 本品1605g中

シコン	100g(6.23%)	豚脂	25g
トウキ	100g(6.23%)	ミツロウ	380g
ゴマ油	1000g		

2) 紫雲膏「マルイシ」は、赤色～赤紫色の軟膏で、わずかに特異なおいがある。

〔効能・効果〕

火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷

〔用法・用量〕

1日1～2回患部皮膚面に塗布するか、又はリント布等にのぼして貼付する。

漢方製剤

し うん こう
紫雲膏「マルイシ」

SG-501

500g

製造販売元 **丸石製薬株式会社**
大阪市鶴見区今津中2-4-2

発売元 **大杉製薬株式会社**
大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

〔使用上の注意〕

(1) 重要な基本的注意

本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

(2) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、瘙癢等

注1)このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

(3) 小児等への投与


小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

(4) 適用上の注意

投与部位：目には使用しないこと。

〔文献請求先〕

大杉製薬株式会社 医薬情報部
〒545-0002
大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

 キャップ：PP
ボトル：PE

製造番号

使用期限

GS1-RSS



JAN

