

去痰剤

日本薬局方 セネガシロップ

セネガシロップ「メタル」

Senega Syrup

貯 法: 室温保存
 使用期限: 容器に表示
 注 意: 「取扱い上の注意」参照

承認番号	16000AMZ05828
薬価収載	1985年12月
販売開始	1986年1月
再評価結果	1981年8月

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者(「相互作用」の項参照)

【組 成 ・ 性 状】

組成

本剤1mL中、日局セネガ0.04gの10vol%エタノール抽出液を含む。添加物として白糖を含む。

製剤の性状

本剤は黄褐色の濃稠な液で、サリチル酸メチル様の特異なにおいがあり、味は甘い。

【効 能 ・ 効 果】

下記疾患に伴う喀痰咯出困難
 急性気管支炎、感冒・上気道炎

【用 法 ・ 用 量】

セネガシロップとして通常成人1日10~35mLを3回に分割経口投与する。
 なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 相互作用

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム ノックピン シアナミド シアナマイド カルモフル ミフロール プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

(2) 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩、セフォペラムナトリウム、セフペラゾンナトリウム、セフミノクスナトリウム水和物、セフメタゾールナトリウム、ラタモキシフナトリウム、メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類/頻度	頻度不明
大量投与	嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振

【薬 効 薬 理】

咽頭などの粘膜刺激により気道液分泌を増加し、分泌された粘液の排出機能をも亢進し、去痰作用をあらわすと推定される。(サポニン)

【取扱い上の注意】

本剤は原料に天然物が含まれておりますので、その産地や採集時期により、製品の色調やにおいが一定しないことがあります。^{1), 2)}

***〈安定性試験〉**

長期安定性試験の結果、本剤は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。³⁾

【包 装】

500mL

***【主 要 文 献】**

- 1) 第十七改正日本薬局方医薬品情報, JPD1, p. 877, (株)じほう, 2016
- 2) 第十七改正日本薬局方解説書, D-527, 廣川書店, 2016
- 3) 社内資料

****【製品情報お問い合わせ先】**

ニプロ株式会社 医薬品情報室
 〒566-8510 大阪府摂津市千里丘新町3番26号
 ☎ 0120-226-898 FAX 050-3535-8939



販売 ニプロ株式会社
 大阪府摂津市千里丘新町3番26号

製造販売



愛知県津島市白浜町字番場52-1