

低血圧治療剤

日本薬局方 エチレフリン塩酸塩錠

※ **エフォリン®錠5mg**
Epholin® Tab. 5mg

貯法：遮光、気密容器、室温保存
使用期限：5年
(容器に表示の使用期限内
に使用すること)

※ 承認番号	21800AMX10731
※ 薬価収載	2006年12月
販売開始	1970年11月
再評価結果	1979年2月

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

1. 甲状腺機能亢進症の患者〔心悸亢進、頻脈等を悪化させるおそれがある。〕
2. 高血圧のある患者〔更に血圧を上昇させるおそれがある。〕

※【組成・性状】

組成

販売名	エフォリン錠5mg
成分・含量 (1錠中)	日本薬局方 エチレフリン塩酸塩5mg含有
添加物	カルボキシメチルセルロースカルシウム、ポリビニルピロリドン、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物、トウモロコシデンプン

製剤の性状

本剤は白色の片面割線入りの錠剤(裸錠)である。

外形			直径 (mm)	厚さ (mm)	質量 (mg)	錠剤識別 コード
表	裏	側面				
			6.0	2.5	90	h-017

【効能・効果】

本態性低血圧、症候性低血圧、起立性低血圧、網膜動脈の血行障害

【用法・用量】

エチレフリン塩酸塩として、通常、成人1回5~10mg(本剤：1~2錠)を1日3回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
 - (1) 急性うっ血性心不全のある患者〔不整脈を悪化させるおそれがある。〕
 - (2) 冠不全のある患者〔冠不全症状を悪化させるおそれがある。〕
2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類	頻度	頻度不明
循環器	心悸亢進	
精神神経系	不眠	
消化器	口渇、悪心、食欲不振、胃腸障害	
過敏症 ^{※)}	発疹	

注)このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

4. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。〕

【薬効薬理】

アドレナリン類似作用を有し、 α 効果と β 効果を現す。本剤は末梢血管抵抗を増加させ、血圧の上昇が起こる。心収縮力、心拍出量、分時拍出量を増加させる。心拍数には変化が起きない。循環血液量が増加する。タキフィラキシーは認められない。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：〔日局〕エチレフリン塩酸塩 (Etilefrine Hydrochloride)


〔日局別名〕塩酸エチレフリン

化学名：(1*R,S*)-2-Ethylamino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol monohydrochloride

分子式：C₁₀H₁₅NO₂ · HCl

分子量：217.69

構造式：



性状：本品は白色の結晶又は結晶性の粉末である。
本品は水に極めて溶けやすく、エタノール(99.5)に溶けやすく、酢酸(100)にやや溶けにくい。
本品は光によって徐々に黄褐色に着色する。
本品の水溶液(1→20)は施光性を示さない。

融点：118~122°C

【包装】

バラ 1000錠

PTP 100錠 1000錠

※※【文献請求先】

マイラン製薬株式会社 研究開発本部 安全管理部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
TEL 03-5733-9863 FAX 03-5733-9859

※※【学術情報に関するお問い合わせ先】

マイラン製薬株式会社 カスタマーサポートセンター
フリーコール 0120-06-6720
(9:00~17:00/土日祝日を除く)

®登録商標

製造販売元

※※ **マイラン製薬株式会社**
大阪市中央区本町2丁目6番8号