

500mL

アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」

＜調剤包装単位用コード＞




(01)04987211201562

＜販売包装単位用コード＞



(01)14987211101562

使用後、フィルムをはがして
キャップをはずした後、空容器
を図のようにして折り目を外側
に押しつぶして下さい。
(つぶした後は元に戻りません。)



キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PET

MARUISHI

開封日 年 月 日

500mL

外用殺菌消毒剤

アクリノール消毒用液0.1%
「マルイシ」

Acrinol Disinfectant Solution 0.1% [Maruishi]

0.1w/v%

製造番号

使用期限

製造販売元

㊞ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

500mL

アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」

2014年9月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872619
承認番号	21900AMX00792
薬価収載	2007年6月
販売開始	2007年6月
再評価結果	1983年4月

貯法：遮光し、室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

注意：衣類、流し等に付着すると黄色に変色し、
脱色しにくくなるので、直ちに水で洗い流す
など注意すること。

●組成・性状

1. 組成

100mL中
アクリノール水和物0.1g(0.1w/v%)含有。

2. 性状

黄色澄明な液である。

●効能・効果 ●用法・用量

効能・効果	用法・用量	希釈倍数
化膿局所の消毒 泌尿器・産婦人 科術中術後、化 膿性疾患(せつ、 よう、扁桃炎、副 鼻腔炎、中耳炎)	0.05～0.2% の液として使 用する。	本品を1～2 倍に希釈して 用いる。
口腔領域におけ る化膿局所の消 毒	0.05～0.1% の液で含嗽 する。	本品を1～2 倍に希釈して 用いる。

500mL

アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」

●使用上の注意

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確
となる調査を実施していない。

	頻度不明
皮膚 ^{注1)}	潰瘍、壊死、塗布部の疼痛・発赤・腫脹等
過敏症 ^{注2)}	過敏症状

注1)このような症状があらわれた場合には使用を中止し、適切
な処置を行うこと。

注2)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

外用にのみ使用し、内服しないこと。