

**2024年10月改訂（第3版）

日本標準商品分類番号

871141

*2023年11月改訂

貯 法：室温保存

有効期間：散 3年6カ月

細粒 3年

鎮痛・消炎・解熱剤

メフェナム酸製剤

ポンタール®散50%

ポンタール®細粒98.5%

PONTAL® POWDER, FINE GRANULES

	散50%	細粒98.5%
承認番号	22000AMX01494	22000AMX01495
販売開始	1970年4月	1981年9月

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 消化性潰瘍のある患者〔本剤の直接作用及びプロスタグランジン生合成抑制により、胃の血流量が減少し、消化性潰瘍を悪化させることがある。〕[9. 1. 2参照]
- 重篤な血液の異常のある患者〔プロスタグランジン生合成抑制による血小板機能障害等の血液異常を悪化させることがある。〕[9. 1. 3参照]
- 重篤な肝機能障害のある患者 [9. 3. 1参照]
- 重篤な腎機能障害のある患者 [9. 2. 1参照]
- 重篤な心機能不全のある患者 [9. 1. 5参照]
- 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- アスピリン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作の誘発）又はその既往歴のある患者〔気管支拡張作用を低下させ喘息発作を誘発することがある。〕[9. 1. 6参照]
- 重篤な高血圧症の患者〔腎のプロスタグランジン生合成抑制により、水、ナトリウムの貯留が起こり、浮腫、血圧上昇を起こすおそれがある。〕[9. 1. 8参照]
- 過去に本剤により下痢を起こした患者〔本剤に対し耐薬性を失い、下痢を再発することが多い。〕
- 妊娠末期の女性 [9. 5. 1参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	ポンタール散50%	ポンタール細粒98.5%
有効成分	1g中 日局 メフェナム酸 500mg	1g中 日局 メフェナム酸 985mg
添加剤	乳糖水和物、ポビドン	ヒドロキシプロピルセルロース、ポリソルベート80、軽質無水ケイ酸

3.2 製剤の性状

販売名	ポンタール散50%	ポンタール細粒98.5%
性状	白色～微黄白色の微細な粒を含む粉末	微黄白色～淡灰白色の細粒剤

4. 効能又は効果

- 手術後及び外傷後の炎症及び腫脹の緩解
- 下記疾患の消炎、鎮痛、解熱
変形性関節症、腰痛症、症候性神経痛、頭痛（他剤が無効な場合）、副鼻腔炎、月経痛、分娩後疼痛、歯痛
- 下記疾患の解熱・鎮痛
急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）

6. 用法及び用量

効能又は効果	用法及び用量
手術後及び外傷後の炎症及び腫脹の緩解	メフェナム酸として、通常、成人1回500mg、その後6時間毎に1回250mgを経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。
下記疾患の消炎、鎮痛、解熱 変形性関節症、腰痛症、症候性神経痛、頭痛（他剤が無効な場合）、副鼻腔炎、月経痛、分娩後疼痛、歯痛	メフェナム酸として、通常、成人1回500mgを頓用する。幼小児に投与する場合には、1回6.5mg/kgを標準用量として頓用する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、原則1日2回までとし、成人に投与する場合は1日最大1500mgを限度とすること。また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。

効能又は効果	用法及び用量
下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）	通常、成人にはメフェナム酸として、1回500mgを頓用する。幼小児に投与する場合には、1回6.5mg/kgを標準用量として頓用する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、原則1日2回までとし、成人に投与する場合は1日最大1500mgを限度とすること。また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。

7. 用法及び用量に関連する注意

- 他の消炎鎮痛剤との併用は避けることが望ましい。

8. 重要な基本的注意

- 消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留意すること。
- 慢性疾患（変形性関節症等）に対し本剤を用いる場合には、次の事項を考慮すること。
 - 長期投与する場合には定期的に尿検査、血液検査及び肝機能検査等を行うこと。
 - 薬物療法以外の療法も考慮すること。
- 急性疾患に対し本剤を用いる場合には、次の事項を考慮すること。
 - 急性炎症、疼痛、発熱の程度を考慮し投与すること。
 - 原則として長期投与を避けること。
 - 原因療法があればこれを行うこと。
- 過度の体温下降、虚脱、四肢冷却等があらわれることがあるので、特に高熱を伴う幼小児及び高齢者又は消耗性疾患の患者においては、投与後の患者の状態に十分注意すること。
- めまい、眠気があらわれることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に注意させること。
- 自己免疫性溶血性貧血、無顆粒球症、顆粒球減少、骨髄形成不全があらわれることがあるので、血液検査を行うなど観察を十分に行うこと。[11. 1. 2、11. 1. 3参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

- 合併症・既往歴等のある患者
 - 消化性潰瘍の既往歴のある患者
潰瘍を再発させることがある。
 - 非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期投与による消化性潰瘍のある患者で、本剤の長期投与が必要であり、かつミソプロストールによる治療が行われている患者
本剤を継続投与する場合には、十分経過を観察し、慎重に投与すること。ミソプロストールは非ステロイド性消炎鎮痛剤により生じた消化性潰瘍を効能又は効果としているが、ミソプロストールによる治療に抵抗性を示す消化性潰瘍もある。[2. 1参照]
 - 血液の異常又はその既往歴のある患者（重篤な血液の異常のある患者を除く）
自己免疫性溶血性貧血、顆粒球減少等の副作用が起こりやすい。[2. 2参照]
 - 出血傾向のある患者
血小板機能異常が起こり、出血時間が延長することがある。

- 9.1.5 心機能異常のある患者（重篤な心機能不全のある患者を除く）
心臓の仕事量が増加するため症状を悪化させるおそれがある。腎のプロスタグランジン生合成抑制により、浮腫、循環体液量の増加が起こる。[2.5参照]
- 9.1.6 気管支喘息のある患者（アスピリン喘息又はその既往歴のある患者を除く）
病態を悪化させることがある。[2.7参照]
- 9.1.7 SLE（全身性エリテマトーデス）の患者
病態を悪化させることがある。
- 9.1.8 高血圧症の患者（重篤な高血圧症の患者を除く）
病態を悪化させるおそれがある。[2.8参照]
- 9.1.9 潰瘍性大腸炎の患者
病態を悪化させることがある。
- 9.1.10 クローン病の患者
病態を悪化させるおそれがある。
- 9.1.11 感染症を合併している患者
必要に応じて適切な抗菌剤を併用し、観察を十分に行い慎重に投与すること。感染症を不顕性化するおそれがある。
- 9.2 腎機能障害患者
- 9.2.1 重篤な腎機能障害のある患者
投与しないこと。薬物排泄機能が著しく低下しているため、本剤の排泄が十分に行われず、異常な体内分布を起こすおそれがある。また、プロスタグランジン生合成抑制により腎機能が低下するため腎障害を悪化させることがある。[2.4参照]
- 9.2.2 腎機能障害又はその既往歴のある患者（重篤な腎機能障害のある患者を除く）
腎血流量が減少し、非乏尿性の急性腎障害が起こることがある。
- 9.3 肝機能障害患者
- 9.3.1 重篤な肝機能障害のある患者
投与しないこと。肝機能が著しく低下しているため、本剤の代謝が十分に行われず、異常な体内分布を起こすおそれがある。また、肝の代謝機能が過剰となり、肝障害を悪化させることがある。[2.3参照]
- 9.3.2 肝機能障害又はその既往歴のある患者（重篤な肝機能障害のある患者を除く）
肝障害を悪化又は再発させることがある。
- 9.5 妊婦
- 9.5.1 妊娠末期の女性
投与しないこと。他の消炎鎮痛剤を妊娠末期に投与したところ、胎児循環持続症（PFC）が起きたとの報告がある。妊娠末期のラットに投与した実験で、胎児の動脈管収縮が報告されている¹⁾。[2.10参照]
- **9.5.2 妊婦（妊娠末期以外）又は妊娠している可能性のある女性
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。投与する際には、必要最小限にとどめ、羊水量、胎児の動脈管収縮を疑う所見を妊娠週数や投与日数を考慮して適宜確認するなど慎重に投与すること。シクロオキシゲナーゼ阻害剤（経口剤、坐剤）を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。シクロオキシゲナーゼ阻害剤（全身作用を期待する製剤）を妊娠中期の妊婦に使用し、胎児の動脈管収縮が起きたとの報告がある。
- 9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。乳汁中へ移行することが報告されている²⁾。
- 9.7 小児等
次の点に注意すること。
・インフルエンザに伴う発熱に対しては、原則として本剤を投与しないこと。
・副作用の発現に特に注意し、必要最小限の使用にとどめるなど慎重に投与すること。代謝・排泄機能が未熟である。
- 9.8 高齢者
次の点に注意すること。
・少量から投与を開始するなど必要最小限の使用にとどめ患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。副作用があらわれやすい。

・長期投与した場合、自己免疫性溶血性貧血があらわれることがある。
[11.1.2参照]

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン	抗凝血作用を増強すること があるので注意し、必要があれば減量すること。	次のような機序が考えられる。 ・ <i>in vitro</i> において、本剤がワルファリンをアルブミン結合部位から遊離置換させ、遊離の活性ワルファリンが増加するとの報告がある。 ・本剤のプロスタグランジン生合成抑制作用により血小板凝集が抑制され、血液凝固能が低下する。 ・本剤のプロスタグランジン生合成抑制作用により消化管粘膜障害が起こり、出血が起こりやすくなる。
第Xa因子阻害剤 エドキサバントシル酸塩 水和物等	出血の危険性を増大させる おそれがある。	抗血栓作用を増強するため と考えられる。
リチウム製剤 炭酸リチウム	血中リチウム濃度を上昇させ、 リチウム中毒を起こすこと があるので血中のリチウム 濃度に注意し、必要があれば 減量すること。	本剤の腎におけるプロスタ グランジン生合成抑制作用 により、炭酸リチウムの腎排 泄が減少し、血中濃度が上昇 するためと考えられる。
チアジド系利尿剤 ヒドロクロロチアジド等	利尿・降圧作用を減弱するお それがある。	本剤の腎におけるプロスタ グランジン生合成抑制作用 により、水、ナトリウムの排 泄を減少させるためと考え られる。
降圧剤 ACE阻害剤、 アンジオテンシンⅡ受容 体拮抗剤等	降圧作用を減弱するおそれ がある。 腎機能を悪化させるおそれ がある。	本剤のプロスタグランジンの 生合成抑制作用により、降 圧作用を減弱させる可能性 がある。 本剤のプロスタグランジンの 生合成抑制作用により、腎 血流量が低下するためと考え られる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック（頻度不明）、アナフィラキシー（頻度不明）

ショック、アナフィラキシー（胸内苦悶、冷汗、喉頭浮腫、呼吸困難、四肢しびれ感、低血圧、結膜充血等）を起こすことがある。

11.1.2 溶血性貧血（頻度不明）、無顆粒球症（頻度不明）

自己免疫性溶血性貧血、無顆粒球症、顆粒球減少があらわれることがある。[8.6、9.8参照]

11.1.3 骨髄形成不全（頻度不明）

[8.6参照]

11.1.4 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis: TEN）（頻度不明）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（頻度不明）

11.1.5 急性腎障害（頻度不明）、ネフローゼ症候群（頻度不明）、間質性腎炎（頻度不明）

乏尿、血尿、尿蛋白、BUN上昇、血中クレアチニン上昇、高カリウム血症、低アルブミン血症等の検査所見があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.6 消化性潰瘍（頻度不明）、大腸炎（頻度不明）

消化性潰瘍、大腸炎、吐血、下血、血便等の消化管出血があらわれることがある。

11.1.7 劇症肝炎（頻度不明）、肝機能障害（頻度不明）、黄疸（頻度不明）

劇症肝炎、AST、ALT、ALP、 γ -GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

**11.1.8 心筋梗塞（頻度不明）、脳血管障害（頻度不明）

心筋梗塞、脳血管障害等の心血管系血栓塞栓性事象があらわれることがある³⁾。

11.2 その他の副作用

	0.1~1.5%未満 ^{a)}	0.1%未満 ^{b)}	頻度不明
血液 ^{b)}			血小板減少性紫斑病、血小板機能低下（出血時間の延長）、血小板減少、好酸球増多
* 過敏症 ^{b)}	発疹	発赤、そう痒	蕁麻疹、固定薬疹
感覚器			霧視
肝臓			黄疸、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、肝障害
消化器	下痢 ^{b)} ・軟便、胃腸障害、食欲不振、悪心、嘔吐、胃痛、腹痛、胃部不快感	口渇、便秘	吐血 ^{b)} 、鼓腸
精神神経系	眠気、めまい、頭痛、倦怠感		痙攣
その他	浮腫	発熱	

a) 発現頻度はメフェナム酸カプセル剤、散剤の市販後調査も含む。

b) 投与を中止すること。

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

イクトテストによる尿ビリルビン検査では偽陽性を呈するので、他の検査法を行うこと⁴⁾。

13. 過量投与

13.1 症状

痙攣、急性腎障害などが報告されている。

*13.2 処置

活性炭の投与を施すなど、症状に応じて適切な処置を行うこと。メフェナム酸は血漿蛋白結合率が高いため、血液透析は有用ではない。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

非ステロイド性消炎鎮痛剤を長期間投与されている女性において、一時的な不妊が認められたとの報告がある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

健康成人男性10例にポンタール散1g（メフェナム酸として500mg）を単回経口投与したとき、メフェナム酸（遊離型メフェナム酸とその抱合体及び遊離型の代謝物とその抱合体を合わせたもの）は投与2時間後に最高血中濃度に達した⁵⁾。

16.3 分布

*16.3.1 血漿蛋白結合率

慢性腎不全患者（4例）におけるメフェナム酸のヒト血漿蛋白結合率は85~97%と報告されている⁶⁾。

16.4 代謝

チトクロームP450分子種（CYP2C8、2C9、2C18、2C19）発現マイクロソームを用いた検討より、メフェナム酸は主としてCYP2C9により代謝された⁷⁾（*in vitro*）。

16.5 排泄

健康成人男性10例にポンタール散1g（メフェナム酸として500mg）を単回経口投与したとき、投与48時間後までに約74%が尿中に排泄された⁵⁾。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 再評価集計（1977年7月）時、本剤（カプセル剤を含む）の臨床試験は、二重盲検比較試験を含め国内の施設において実施され、適応疾患を対象とした臨床成績の概要は次のとおりである。

疾患名	やや有効以上 (%)
手術後の痛み	1,825/2,071 (88.1)
外傷痛	204/230 (88.7)
関節痛	164/214 (76.6)
腰痛	361/447 (80.8)
神経痛	332/389 (85.3)
頭痛	319/440 (72.5)
鼻・副鼻腔炎	46/53 (86.8)

疾患名	やや有効以上 (%)
月経痛	39/48 (81.3)
分娩後疼痛	41/52 (78.8)
歯痛	433/487 (88.9)

17.1.2 再評価集計（1994年9月）時、本剤（カプセル剤を含む）の臨床試験は、二重盲検比較試験を含め国内17施設において、急性上気道炎を含む発熱患者を対象に実施され、その有効率（やや有効以上）は89.0%（566/636）であった。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

本剤の作用機序は、プロスタグランジン合成抑制作用である⁸⁾。

18.2 鎮痛作用

薬物の鎮痛活性がより選択的に測定し得るとされる火傷足再加熱法（ラット）によるメフェナム酸のID₅₀値は13.9mg/kg、Randall-Selitto法変法（ラット）によるID₅₀値は14.0mg/kgを示した⁹⁾。

18.3 抗炎症作用

カラゲニン浮腫法（ラット）によるメフェナム酸のID₅₀値は55.3mg/kg⁹⁾、紫外線紅斑法（モルモット）によるED₅₀値は12mg/kgを示した^{10, 11)}。また、アジュバント関節炎法（ラット）によるメフェナム酸の効力は、フェニルブタゾンの0.51倍を示した¹²⁾。

18.4 解熱作用

“E” Pyrogenにより発熱させたマウスの実験から、アスピリンよりすぐれた解熱作用が認められた¹³⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：メフェナム酸 (Mefenamic Acid)

化学名：2-(2,3-Dimethylphenylamino)benzoic acid

分子式：C₁₅H₁₅NO₂

分子量：241.29


性状：白色～淡黄色の粉末で、においはなく、味は初めないが、後に僅かに苦い。

ジエチルエーテルにやや溶けにくく、メタノール、エタノール（95）

又はクロロホルムに溶けにくく、水にほとんど溶けない。

水酸化ナトリウム試液に溶ける。

化学構造式：



融点：約225℃（分解）

分配係数：

pH	1.2（日局、第1液）	6.8（日局、第2液）
分配係数（log Pow）	≥4.0	2.7

Pow=（オクタノール相のメフェナム酸濃度/水相のメフェナム酸濃度）

（フラスコ振とう法）

20. 取扱い上の注意

外箱開封後は直射日光を避け保存すること。

22. 包装

〈ポンタール散50%〉

100g [瓶：バラ]

500g [缶：バラ]

〈ポンタール細粒98.5%〉

100g [瓶：バラ]

**23. 主要文献

1) 門間和夫：日本薬剤師会雑誌 1982；34（8）：745-752

2) Buchanan RA, et al. : Curr Ther Res Clin Exp. 1968；10（11）：592-599

- 3) データベース調査結果の概要 (NDBを用いた非ステロイド性抗炎症薬による心血管系イベント発現のリスク評価) :
<https://www.pmda.go.jp/files/000270714.pdf>
- 4) 金澤知徳：臨床病理 1980 ; 28 (5) : 487-491
- 5) 社内資料：メフェナム酸の血中濃度、尿中排泄 (ヒト)
- 6) Wang Lo-Hwa, et al. : Am J Hosp Pharm. 1980 ; 37 : 956-958
- 7) 千葉 寛ほか：薬物動態 1994 ; 9 (Suppl) : S144-S147
- 8) Flower RJ, et al. : Biochem Pharmacol. 1974 ; 23 (10) : 1439-1450
- 9) 飯塚義夫ほか：日本薬理学雑誌 1974 ; 70 (5) : 697-705
- 10) Scherrer RA, et al. : Antiinflammatory Agents Chemistry and Pharmacology Vol.1 Academic Press 1974 : 46-64
- 11) Winder CV, et al. : Ann Phys Med. 1966 ; (Suppl) : 7-16
- 12) Wax J, et al. : J Pharmacol Exp Ther. 1975 ; 192 (1) : 172-178
- 13) Cashin CH, et al. : Br J Pharmacol. 1968 ; 34 (1) : 148-158

24. 文献請求先及び問い合わせ先

ファイザー株式会社

Pfizer Connect/メディカル・インフォメーション

〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7

TEL 0120-664-467

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

ファイザー株式会社

東京都渋谷区代々木3-22-7