



**フェノール・亜鉛華リニメント**  
**「東豊」**  
 日本薬局方 フェノール・亜鉛華リニメント  
 Phenol and Zinc Oxide Liniment

開封日 年 月 日

500 g

製造販売元  
**東豊薬品株式会社**  
 東京都葛飾区西新小岩4-15-3

※2015年6月改訂（第5版）  
 （組成の記載方法変更）  
 2008年9月改訂（第4版）  
 （局方名、販売名併記）  
**【貯 法】** 気密容器、室温保存  
**【使用期限】** 製造の翌月から3年

日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16000AMZ05475
薬価収載	2008年7月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1982年8月

**鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤**

**【禁 忌】**（次の部位には使用しないこと）  
 び爛・潰瘍・結痂・損傷皮膚及び粘膜  
 [刺激作用を有するので]

**【組成・性状】**  
 ※組 成：1 g中 液状フェノール 22 μL  
                   トラガント末 20mg  
                   カルメロースナトリウム 30mg  
                   グリセリン 30 μL  
                   酸化亜鉛 100mg  
 性 状：本剤は白色ののり状で、わずかにフェノールのにおいがある。  
**【効能又は効果】** 皮膚癢痒症、汗疹、じん麻疹、小児ストロフルス、虫さされ  
**【用法及び用量】** 通常1日1～数回適量を患部に塗布する。  
 なお、症状により適宜増減する。  
**【使用上の注意】**  
 1. 副作用：本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	過敏症状
皮膚 <sup>注)</sup>	発疹、刺激感

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。  
 2. 適用上の注意  
 (1) 眼には使用しないこと。  
 (2) 長期間又は広範囲に使用しないこと。

 容 器：PE  
 キャップ：PP  
 パッキン：PE  
 外装フィルム：PE

製造番号  
 使用期限

調剤



販売

