

貯法	室温保存
使用期限	包装に表示の使用期限内に使用すること。

腎機能検査用薬

処方箋医薬品\*

日本標準商品分類番号
877225

**承認番号	22100AMX01194
薬価収載	1950年9月
**販売開始	2009年9月
再評価結果	1983年4月

日本薬局方 フェノールスルホンフタレイン注射液  
**フェノールスルホンフタレイン注0.6%「第一三共」**  
 PHENOLSULFONPHTHALEIN INJECTION “DAIICHI SANKYO”

※注意—医師等の処方箋により使用すること

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

1. 組成

1 アンプル中に次の成分を含有

販売名	有効成分	添加物
フェノールスルホンフタレイン注0.6%「第一三共」	フェノールスルホンフタレイン(日局)(略名:PSP) 7.8mg/1.3mL(0.6 <sup>W</sup> /v%)	塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、pH調節剤

2. 製剤の性状

販売名	pH (日本薬局方)	浸透圧比 (生理食塩液対比)	外観
フェノールスルホンフタレイン注0.6%「第一三共」	6.0~7.6	約1	だいたい黄色~赤色澄明の液

【効能・効果】

腎機能検査

【用法・用量】

排尿後、水300~500mLを飲ませ、30分後に通常成人ではフェノールスルホンフタレイン注射液1.0mL(フェノールスルホンフタレインとして6.0mg)を肘静脈又は筋肉内に注射する。

小児用量例

体重(kg)	3~5	5~10	10~20	20以上
注射量(mg)	2	3	4	6

(「測定法」の項参照)

【使用上の注意】

- 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)  
アレルギー素因のある患者
- 重要な基本的注意  
注入から検査終了まで、被検者に横臥又は坐位をとらせるなど安静にさせ観察を十分に行うこと。
- 副作用(再審査対象外)  
過敏症(0.1%未満):発赤、そう痒感、顔面潮紅、胸内苦悶、血圧低下等があらわれることがある。
- 高齢者への投与  
一般に高齢者では生理機能が低下しているので患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。
- 妊婦、産婦、授乳婦等への投与  
(1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には診断上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]  
(2)授乳婦への投与は避けさせることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は授乳を避けさせること。[授乳中の投与に関する安全性は確立していない。]
- 適用上の注意  
(1)筋肉内注射時:筋肉内注射にあたっては、組織・神経等への影響を避けるため下記の点に注意すること。  
1)注射部位については、神経走行部位を避けて慎重に投与すること。

- くりかえし注射する場合には、左右交互に注射するなど、同一部位を避けること。なお、低出生体重児、新生児、乳児、幼児、小児には特に注意すること。
- 注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり、血液の逆流をみた場合は、直ちに針を抜き、部位をかえて注射すること。

(2)開封時:アンプルカット時の異物混入を避けるため、エタノール消毒綿等で清拭しカットすること。

7. 診断上の注意

下記の場合、測定値に誤差を生じることがある。

- 患者の体の状態による影響  
1)黄疸あるいは胆道閉塞がある場合  
2)循環器系の不全がある場合  
3)脱水状態又は発熱がある場合  
4)尿の着色、混濁又は血尿がある場合
- 薬剤との併用による影響  
1)抗コリン薬、アスピリン、プロベネシド、ペニシリン、サルファ剤、サイアザイド系利尿薬[PSPの排泄を遅らせ、測定値に誤差を生じることがある。]  
2)アントラキノン類、スルホプロモフタレインナトリウム(BSP)、フェノールフタレイン、ヘキサミン[尿の変色が起こり、尿中PSP排泄量のみかけ上増加することが報告されている。]

【測定法】

1. 採尿

注射後15、30、60及び120分の4回採尿する。尿量が少ないとき(40mL以下)成績は不正確となる。尿量が少ない場合には排尿はカテーテルで行うことが望ましい。

2. 比色

各分画採取尿をそれぞれメスシリンダーに採り、25%水酸化ナトリウム溶液数滴(10%水酸化ナトリウム溶液5mLでも良い)を加え、十分に呈色させた後1,000mLの目盛まで水で希釈し、栓をして混和する。この各分画採取呈色尿をフェノールスルホンフタレイン標準液と比色し、色素排泄量を求める。

光電比色法による操作法は次のとおりである。

- 各分画採取尿を1,000mLのメスシリンダーに採り、水で500mLに希釈する。それから5mLずつを採り水5mLを加え85%リン酸1滴を加え酸性とする。これを対照尿として用いる。
- シリンダー中の残部に10%水酸化ナトリウム溶液10mLを加え、十分発色させ、水で1,000mLに希釈する。
- 前記対照尿を用い559nmで比色し、別に作製した検量線から尿中フェノールスルホンフタレインの濃度を求める。なお、色素が退色するので、採尿後なるべく早く行う。特に水酸化ナトリウム溶液で赤変させた尿は1時間以内に測定する。
- 検量線の作製法:本剤1.0mLを試験尿と同様の方法で1,000mLに希釈し、これを100%標準液とし、5、10、15…(%)の希釈系列を作り、上記と同様に操作して検量線を作製する。

### 3. 標準液

標準液の調製は、フェノールスルホンフタレイン注射液1.0mLを正確に1Lのメスフラスコに採り、精製水500mL及び10%水酸化ナトリウム溶液2.0mLを加えた後、さらに目盛まで精製水を加え希釈混和する。この液を100%標準液とし順次希釈して標準液系列を作る。(表参照)

なお、100%標準液は冷暗所に保存すれば6ヵ月間はほとんど褪色しない。

標準液濃度(%)	100	80	60	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5
100%液(mL)	5.00	4.00	3.00	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25
精製水(mL)	0	1.00	2.00	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75

#### 〈参考〉

健康成人の時間別PSP排泄率は次のとおりである。

時間(分)	最小(%)	最大(%)	平均(%)
15	25	50	35
30	40	60	50
60	50	75	65
120	55	85	70

筋肉内注射の場合は、注射後第1時間尿に35～60%、第2時間尿に15～25%、すなわち2時間合計尿50～80%をもって正常とし、50%以下の場合は腎機能障害がある。

また年齢別の15分値は概ね次のとおりである<sup>1)</sup>。

年齢	平均値	棄却限界
小児	40%	—
20～29歳	41	52～31%
30～39歳	36	50～22
40～49歳	36	50～23
50～59歳	33	47～20
60～69歳	31	43～19
70～79歳	29	40～18

軽度の腎障害では120分値が正常であっても15分値は低値を示すことが多く重症の腎炎、ネフローゼ等では15分、120分ともに低値を示す。

一般的に静脈内注射で15分値が25%以下の場合には2時間の総排泄量のいかんにかかわらず腎機能、特に尿細管の障害を意味する。

### 【薬物動態】

#### 1. 血漿蛋白結合<sup>2)</sup>

血液に入った本剤は赤血球中には入らず、血漿中に存在し、大部分が血漿蛋白、特にアルブミンと結合する。静脈内注射された本剤の80%は血漿蛋白と結合している。

#### 2. 排泄

本剤と血漿蛋白との結合は強固なものではなく、非常に離れやすい性質をもっているため、腎より速やかに排泄される<sup>2,3)</sup>。その排泄の比率は糸球体で6%、尿細管で94%と考えられている<sup>2)</sup>。

### 【薬効薬理】

本剤を静脈又は筋肉内に注射すると、体内で酸化分解を受けることなく、大部分が腎臓の近位尿細管から尿中に速やかに排泄される。腎障害があると尿中への排泄が遅延する。したがって、フェノールスルホンフタレインが尿中に最初に排泄される時間と、一定時間内でのフェノールスルホンフタレイン排泄量を測定することで、腎機能を検査することができる<sup>4～9)</sup>。

フェノールスルホンフタレイン試験の15分値は腎血流量とよく相関するので、日常腎機能のスクリーニングテストとして適しており、糸球体腎炎や本態性高血圧症等の腎硬化症、糖尿病性腎症等でも本試験によりおおよその腎機能の程度を知ることができる<sup>10)</sup>。

また本剤は大部分近位尿細管から排泄されるので、糸球体濾過値と比較することにより、糸球体濾過値が良好であるにもかかわらず本試験の値が悪い時は、腎盂腎炎等の尿細管障害が疑われる<sup>10)</sup>。

### 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：フェノールスルホンフタレイン(Phenolsulfonphthalein)


略名：PSP

化学名：2-[Bis(4-hydroxyphenyl)methylumyl]benzenesulfonate

分子式：C<sub>19</sub>H<sub>14</sub>O<sub>5</sub>S

分子量：354.38

構造式：



性状：鮮赤色～暗赤色の結晶性の粉末である。水又はエタノール(95)に極めて溶けにくい。水酸化ナトリウム試液に溶ける。(フェノールスルホンフタレインは酸性側で黄色であるが、アルカリ側で赤色に変わるので、この赤色を比色定量し、投与量に対する排泄量の百分比が求められる。)

### 【取扱い上の注意】

本品は、「ワンポイントカットアンプル」を使用しているため、アンプル枝部のマークを上にして、反対方向に折りとること。

### 【包装】

フェノールスルホンフタレイン注0.6%[第一三共](1.3mL) 10アンプル(日本薬局方フェノールスルホンフタレイン注射液)

### 【主要文献】

- 1) 古川俊之ほか：正常値(2版)(医学書院)1973：18-20
- 2) 波多野道信：臨床検査 1960；4(5)：285-287
- 3) 柴田久雄ほか：臨床検査 1971；15(4)：380-384
- 4) Chapman EM, et al.：Am J Med Sci. 1933；186(2)：223-232
- 5) McGee LC, et al.：Ann Intern Med. 1940；13(9)：1626-1637
- 6) 齊藤正行：アメリカ医学 1949；4(11)：489-493
- 7) 渡辺一郎ほか：総合医学 1950；7(10)：485-487
- 8) 三輪清三ほか：診療の実際 1952；3(1)：39-44
- 9) 浦壁重治ほか：臨床検査 1965；9(4)：299-306
- 10) 小酒井望ほか：負荷試験(医学書院)1972：56-60

### \*【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

第一三共株式会社 製品情報センター  
〒103-8426 東京都中央区日本橋本町3-5-1  
TEL：0120-189-132



Daiichi-Sankyo

製造販売元

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1