

殺菌消毒剤

500mL

日本薬局方

クレゾール石ケン液

SAPONATED CRESOL SOLUTION

クレゾール石ケン液「ニココー」

※2011年12月 改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872616
承認番号	16100AMZ01300
薬価収載	1979年1月
販売開始	2010年8月
再評価結果	1982年8月

貯法：遮光し、室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)



Mylan

発売元 **マイラン製薬株式会社**
大阪市中央区本町2丁目6番8号

製造販売元 **日興製薬株式会社**
岐阜県羽島市江吉良町1593

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚[吸収され、中毒症状を起こすおそれがある。]

※【組成・性状】

1. 組成

本品は定量するとき、クレゾール42～52vol%を含む。
添加物としてダイズ油、水酸化ナトリウムを含有する。

2. 性状

本品は黄褐色～赤褐色の粘稠性のある液で、クレゾール臭がある。
水、エタノール(95)またはグリセリンと混和する。
本品はアルカリ性である。

【効能・効果】【用法・用量】

各効能・効果に対して、クレゾール石ケン液として下記の濃度に希釈して使用する。

- 手指・皮膚の消毒…1～2% (50～100倍希釈液)
- 手術部位(手術野)の皮膚の消毒…1～2% (50～100倍希釈液)
- 医療機器の消毒…1～2% (50～100倍希釈液)
- 手術室・病室・家具・物品などの消毒…1～2% (50～100倍希釈液)
- 排泄物の消毒…3% (33倍希釈液)
- 腫の洗浄…0.2% (500倍希釈液)

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1)原液または濃厚液が皮膚に付着した場合には刺激症状及び吸収され、中毒症状を起こすことがあるので、直ちに拭きとり石けん水と多量の水でよく洗い流すこと。
- (2)眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
- (3)本剤は必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
- (4)炎症または易刺激性の部位に使用する場合には、濃度に注意して正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
その他の副作用
過敏症 紅斑等の過敏症状があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。

3. 適用上の注意

(1)人体

投与経路:外用にのみ使用すること。

使用時:

- 1)密封包帯、ギプス包帯、パックに使用すると刺激症状及び吸収され、中毒症状があらわれるおそれがあるので、使用しないこと。
- 2)長期間または広範囲に使用しないこと。[吸収され、中毒症状を起こすおそれがある。]

(2)その他

- 1)合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装剤、テール等には変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- 2)希釈する水にアルカリ土類金属塩、重金属塩、第二鉄塩、酸類が存在する場合、変化することがあるので注意すること。
- 3)本剤は常水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるが、このような場合には上澄み液を使用すること。

【薬効薬理】

本剤は使用濃度において、グラム陽性菌、グラム陰性菌、結核菌には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び大部分のウイルスに対する効果は期待できない。

【取扱い上の注意】

誤飲を避けるため、保管及び取扱いには十分注意すること。

【製品に関するお問い合わせ先】

マイラン製薬株式会社 カスタマーサポートセンター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
フリーダイヤル:0120-194-701 FAX:0120-933-850



容器:PE

金属キャップ

製造番号

使用期限



JAN

4