

貯法 ：保存条件 30℃以下で保存，吸湿注意 容 器 気密容器
使用期限 ：外箱に表示の使用期限内に使用すること
注 意 ：「取扱い上の注意」の項参照

承認番号	16100AMZ00039000
薬価収載	1986年1月
販売開始	2006年1月
再評価結果	1983年4月

健胃消化剤

日本薬局方 パンクレアチン ** パンクレアチン「日医工」 PANCREATIN

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

1. 本剤に対し過敏症の既往歴のある患者
2. ウシ又はブタたん白質に対し過敏症の既往歴のある患者
[ウシ又はブタの膵臓由来の消化酵素であるため。]

【組成・性状】

1. 組 成
1g中 日本薬局方 パンクレアチン 1gを含有する。
2. 製剤の性状
本品は白色～淡黄色の粉末で，特異なにおいがある。

【効能・効果】

消化異常症状の改善

【用法・用量】

パンクレアチンとして，通常，成人1回1gを1日3回食後に経口投与する。なお，年齢，症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻 度 不 明
過 敏 症 ^{注)}	くしゃみ，流涙，皮膚発赤等

注) このような場合には投与を中止すること。

2. 適用上の注意

服用時

- (1) 直ちに飲み下すように注意すること。(小児が誤って本剤を大量に停滞させたため，口内炎及び口腔内潰瘍を起こしたとの報告がある。)
- (2) 粉末を吸入しないよう注意すること。(本剤の吸入により気管支痙攣，鼻炎を起こしたとの報告がある。)

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：パンクレアチン (Pancreatin)

性 状：白色～淡黄色の粉末で，特異なにおいがある。

【取扱い上の注意】

配合変化：酸性又は強アルカリ性により失活する。

【包 装】

パンクレアチン「日医工」
500g

【問い合わせ先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
☎(0120)517-215 Fax(076)442-8948