

**2012年6月改訂(第4版)

*2009年6月改訂

貯 法
保存条件 室温保存
容 器 気密容器
使用期限 ラベルに記載
注 意 「取扱い上の注意」の項参照

【禁 忌 (次の患者には使用しないこと)】

ヨード過敏症の患者

【組成・性状】

1. 組 成

本品は定量するとき、ヨウ素 (I: 126.90) 2.8~3.2w/v%
及びヨウ化カリウム (KI: 166.00) 1.9~2.1w/v%を含む。

100mL中 日本薬局方 ヨウ素 3g
添加物 日本薬局方 ヨウ化カリウム
日本薬局方 エタノール

2. 製剤の性状

本品は暗赤褐色の液で、特異なにおいがある。
比重 d_{20}^{20} : 約0.93 アルコール数: 6.7以上

【効能・効果】

皮膚表面の一般消毒、創傷・潰瘍の殺菌・消毒、
歯肉及び口腔粘膜の消毒、根管の消毒

【用法・用量】

本剤をそのまま又は2~5倍に希釈し、1日2~3回患部及
び皮膚に適量塗布する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には、
直ちによく水洗すること。
- (2) 粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと。

2. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確
となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^(注)	ヨード疹等
皮 膚 ^(注)	刺激症状

(注) このような症状があらわれた
場合には使用を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響

血漿たん白結合ヨード (PBI) 及び甲状腺放射性ヨード摂取率
の検査値に影響を及ぼすことがある。

外皮用殺菌消毒剤

日 本 薬 局 方

希ヨードチンキ

**〈希ヨードチンキ「日医工」〉

DILUTE IODINE TINCTURE

500mL

月 日 開 封

月 日 期 限

製造番号

使用期限

製造販売元
** NICHIKO 日医工株式会社
富山市総曲輪1丁目6番21

日本標準商品分類番号
872612

承認番号 16100AMZ00098000
**薬価収載 2012年6月
販売開始 2006年1月
再評価結果 1983年4月

4. 適用上の注意

(1) 投与経路: 外用にのみ使用し、内服しないこと。

(2) 使用時

- 1) 深い創傷に使用する場合は希釈液としては注射用水が滅菌
精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。
- 2) 同一部位に反復使用した場合には、表皮の剥離を伴う急
性の皮膚炎を起こすことがあるので注意すること。
- 3) 口腔内に使用するときは、患部を乾燥させて塗布すること。
- 4) 引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名: ヨウ素 (Iodine) 分子式: I 分子量: 126.90

【取扱い上の注意】

配合変化: マーキュロクロム液とは沈殿を生じる。

【包 装】

500mL

*【問い合わせ先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
☎(0120) 517-215 Fax (076) 442-8948

＜調剤包装単位用＞



＜販売包装単位用＞



キャップ: PP

ガラス: ボトル

