

* 2012年6月改訂(第6版)

* 2011年8月改訂

貯
法
保存条件 遮光、室温保存
容
器 気密容器
使用期限 ラベルに記載

【禁
忌 (次の部位には使用しないこと)]
損傷皮膚 [吸収され、中毒症状を起こすおそれがある。]

【組成・性状】

1. 組成
100mL中 日本薬局方 クレゾール 50mL含有。
添加物 ダイズ油、水酸化ナトリウム

2. 製剤の性状

本品は黄褐色～赤褐色の粘稠性のある液で、クレゾール臭がある。
本品は水、エタノール(95)又はグリセリンと混和する。
本品はアルカリ性である。

【効能・効果】 【用法・用量】

クレゾールとして、下記の濃度に希釈して使用する。

効能・効果	用法・用量	本品希釈倍数
手指・皮膚の消毒	0.5～1%	50～100倍
手術部位(手術野)の皮膚の消毒	0.5～1%	50～100倍
医療機器の消毒	0.5～1%	50～100倍
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	0.5～1%	50～100倍
排泄物の消毒	1.5%	33倍
廻の洗浄	0.1%	500倍

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合には刺激症状を起こすことがあるので、直ちに拭きとり石けん水と水でよく洗い流すこと。
- (2) 眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。
- (3) 本剤は必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
- (4) 炎症又は易刺激性の部位に使用する場合には、通常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。

外用殺菌消毒剤
防疫用殺菌消毒剤
日本薬局方

クレゾール石ケン液

**<クレゾール石ケン液「日医工」>

SAPONATED CRESOL SOLUTION

500mL



製造番号

使用期限

GS1-RSS

JAN

(01)14987376594315



日本標準商品分類番号
872616,877325

承認番号 16000AMZ05388000
** 薬価収載 2012年6月
販売開始 2006年1月
再評価結果 1982年8月

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

頻度 不明

過敏症^(注) 過敏症状(紅斑等)

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 適用上の注意

(1) 人 体

1) 投与経路: 外用にのみ使用すること。

2) 使用時

①長期間又は広範囲に使用しないこと。
②密封包帯、ギプス包帯、パックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないこと。

(2) その他

1) 希釈する水にアルカリ土類金属塩、重金属塩、第二鉄塩、酸類が存在する場合変化があるので注意すること。
2) 本剤は常水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるが、このような場合には上澄み液を使用すること。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名: クレゾール(Cresol)

分子式: C₇H₈O

分子量: 108.14

*【包 装】

500mL

【問い合わせ先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

TEL(0120)517-215 Fax(076)442-8948

ボトル: PE
シュリンク: PVC
金属: キャップ