

外用殺菌消毒剤 500 mL

日本薬局方 エタノール

エタノール「NP」

ETHANOL

禁忌（次の場合には使用しないこと）
損傷皮膚及び粘膜〔損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。〕

■組成・性状

1.組成

販 売 名	エタノール「NP」
有 効 成 分	エタノール 95.1～96.9vol%含有

2.製剤の性状

性 状	無色澄明の液で、燃えやすく、揮発性である
-----	----------------------

■効能・効果

手指・皮膚の消毒、手術部位（手術野）の皮膚の消毒、医療機器の消毒

■用法・用量

本剤830mLを精製水でうすめて1000mLとし、これを消毒部位に塗布する。



製造販売 ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

2013年11月作成（第1版）

日本標準商品分類番号 872615

承認番号	22500AMX00826
薬価収載	2013年12月
販売開始	1965年11月
再評価結果	1982年 8 月

貯 法：密栓し、室温・遮光保存
火気を避けて保存
使用期限：ラベル右下に表示

■使用上の注意

1.重要な基本的注意

- 1) 眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
- 2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
〔エタノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。〕

2.副作用

本剤は、副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等
皮 膚 ^{注)}	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

3.適用上の注意

- 1) 投与経路
外用にのみ使用すること。
- 2) 使用時
 - (1) 同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - (2) 本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
 - (3) 金属器具を長時間浸漬する場合には、腐食を防止するために0.2～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。
 - (4) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。

(5) 本剤は引火性、爆発性があるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分に注意すること。また、電気メスによる発火事故が報告されているので、電気メス等を使用する場合には本剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。

4.その他の注意

承認外の経皮的エタノール注入療法（PEIT）使用例で、注入時の疼痛、酩酊感、発熱、本剤の局所外流出による重篤な胆道・腹腔内等での出血、肝梗塞、肝不全等が報告されている。

■取扱い上の注意

安定性試験

最終包装製品を用いた長期保存試験〔室温（1～30℃）、5年間〕の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、本剤は通常の市場流通下において5年間安定であることが確認された。

■製品情報お問い合わせ先

ニプロ株式会社 医薬品情報室
〒541-0045 大阪市中央区道修町2丁目2番7号
☎ 0120-226-898 FAX 06-6231-7910



キャップ:PP

ガラス 瓶

A-1

第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ

火気厳禁

JAN

< 調剤包装単位用コード >



GS1



< 販売包装単位用コード >

GS1



製造番号

使用期限