

消化酵素剤

# ジアスター<sup>ゼ</sup>原末 「マルイシ」

Diastase「Maruishi」

日本薬局方  
ジアスター<sup>ゼ</sup>

NIPRO  
販 売 ニプロ株式会社  
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

製造販売元  
丸石製薬株式会社  
大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

500g

500g

500g

# ジアスター<sup>ゼ</sup>原末 「マルイシ」

製造番号

使用期限

<調剤包装単位用コード>  
(01)04987190671912

<販売包装単位用コード>  
(01)14987190748642

B-1



消化酵素剤

# ジアスター<sup>ゼ</sup>原末 「マルイシ」

Diastase「Maruishi」

日本薬局方  
ジアスター<sup>ゼ</sup>

NIPRO  
販 売 ニプロ株式会社  
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

製造販売元  
丸石製薬株式会社  
大阪市鶴見区今津中2-4-2



# ジアスター<sup>ゼ</sup>原末「マルイシ」

2016年9月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872331
承認番号	22000AMX02198
薬価収載	2008年12月
販売開始	2013年12月
再評価結果	1983年4月

貯 法 : (1)吸湿注意  
(2)30°C以下で保存すること。  
使用期限 : 3年(表示の使用期限を参照すること。)

- 禁忌(次の患者には投与しないこと)  
本剤に対し過敏症の既往歴のある患者

- 組成・性状
  - 1.組成  
本品1g中 日局ジアスター<sup>ゼ</sup>1g 含有。
  - 2.性状  
淡黄色～淡褐色の粉末である。  
本品は吸湿性である。

- 効能・効果  
主として炭水化物の消化異常症状の改善

- 用法・用量  
通常成人1回0.3～0.5gを1日3回食後に経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。

- 使用上の注意  
副作用  
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。  
その他の副作用  
過敏症：発疹等の過敏症状があらわれた場合には投与を中止すること。