

マツウラのコウジン末（調剤用）

組 成

本品は、日本薬局方コウジンを粉末としたものである。
本品1g中、コウジン末1gを含有する。

効能・効果

漢方処方調剤に用いる。

用法・用量

漢方処方調剤に用いる。

取扱い上の注意

- 直射日光・湿気を避け、密栓して保管すること。
- 天然物ですので、若干色調の異なることがあります
が、効果には変わりありません。

容 量

500g

マツウラ コウジン末

（調剤用）

日本標準商品分類番号 875100

承認番号等 16100AMZ03641000

（薬価基準収載）

M-105

コウジン末

製造販売元



松浦薬業株式会社

名古屋市緑区大高町寅新田36

使用上の注意

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 高血圧症の患者〔血圧が上昇するおそれがある。〕
- (2) 高熱のある患者
- (3) 浮腫や尿量減少のある患者
- (4) 実証者で不眠症や煩燥症状のある患者
- (5) 炎症症状のある患者
- (6) 化膿性疾患のある患者
〔(2)～(6)：これらの疾患及び症状が悪化するおそれがある。〕

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹等

注)このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

5. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない〕

6. その他の注意

本剤の継続投与により、頭痛、不眠、動悸、血圧上昇等があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

調剤包装単位



(01)04987457900571

販売包装単位



(01)14987457105010



B1