

## 組 成

本品は、日本薬局方ブシ（高圧蒸気処理により加工したものを）を刻んだものである。

## 効能・効果

漢方処方調剤に用いる。

## 用法・用量

漢方処方調剤に用いる。

## 取扱い上の注意

- 煎じる場合（煎剤、浸剤）は1日分ずつとし、その日のうちに服用させること。
- 直射日光・湿気を避け、密栓して保管すること。
- 天然物ですので、若干色調の異なることがあります。が、効果には変わりありません。

## 容 量

500g

調剤包装単位



(01)04987457900588

# 劇 日本薬局方 ブシ

## マツウラの修治附子 （調剤用）

日本標準商品分類番号 875100  
承認番号等 16300AMZ00419000  
（薬価基準収載）

# M-106（粗刻）

製造販売元

 松浦薬業株式会社  
名古屋市中区円上町24-21

## 使用上の注意

### 1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 体力の充実している患者〔副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。〕
- (2) 暑がり、のぼせが強く、赤ら顔の患者〔心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。〕

### 2. 重要な基本的注意

漢方製剤等を併用する場合、ブシを含む製剤との併用には、注意すること。

### 3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施し

ていないため、発現頻度は不明である。

|     | 頻度不明               |
|-----|--------------------|
| その他 | 心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等 |

### 4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

### 5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔副作用があらわれやすくなる。〕

### 6. 小児等への投与

小児等には慎重に投与すること。

販売包装単位



(01)14987457106017



C1

## 組 成

本品は、日本薬局方ブシ（高圧蒸気処理により加工したものを）を刻んだものである。

## 効能・効果

漢方処方調剤に用いる。

## 用法・用量

漢方処方調剤に用いる。

## 取扱い上の注意

- 煎じる場合（煎剤、浸剤）は1日分ずつとし、その日のうちに服用させること。
- 直射日光・湿気を避け、密栓して保管すること。
- 天然物ですので、若干色調の異なることがあります。が、効果には変わりありません。

## 容 量

500g

調剤包装単位



(01)04987457900595

# 劇 日本薬局方 ブシ

## マツウラの修治附子 （調剤用）

日本標準商品分類番号 875100  
承認番号等 16300AMZ00419000  
（薬価基準収載）

# M-106（細刻）

製造販売元

 松浦薬業株式会社  
名古屋市中区円上町24-21

## 使用上の注意

### 1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 体力の充実している患者〔副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。〕
- (2) 暑がり、のぼせが強く、赤ら顔の患者〔心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。〕

### 2. 重要な基本的注意

漢方製剤等を併用する場合、ブシを含む製剤との併用には、注意すること。

### 3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施し

ていないため、発現頻度は不明である。

|     | 頻度不明               |
|-----|--------------------|
| その他 | 心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等 |

### 4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

### 5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔副作用があらわれやすくなる。〕

### 6. 小児等への投与

小児等には慎重に投与すること。

販売包装単位



(01)14987457107014



C1