

規制区分：処方箋医薬品^{注)}
貯 法：室温保存
使用期限：包装箱、ラベルに表示。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方生理食塩液
生食注 20mL「TX」
Isotonic Sodium Chloride Solution

日本標準商品分類番号
8 7 3 3 1 1

	承認番号	薬価収載	販売開始
20mL 管	22600AMX00275000	2014年6月	2014年6月

【組成・性状】

1. 組成

本剤は、1 管 20mL 中に日本薬局方塩化ナトリウム 0.18g を含有する水性注射液である。

[電解質濃度 (mEq/L：理論値)]

Na ⁺	Cl ⁻
154	154

2. 性状

本剤は、pH4.5 ～ 8.0 の無色澄明の液で、弱い塩味がある。
また、本剤は、日本薬局方生理食塩液をポリエチレン製プラスチック容器に充填した注射液である。

【効能・効果】

注射

細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クロール欠乏時、注射剤の溶解希釈剤

外用

皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、
含そう・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進
その他

医療用器具の洗浄

【用法・用量】

注射

- 通常 20 ～ 1000mL を皮下、静脈内注射または点滴静注する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
- 適量を取り、注射用医薬品の希釈、溶解に用いる。

外用

- 皮膚、創傷面、粘膜の洗浄、湿布に用いる。
- 含そう、噴霧吸入に用いる。

その他

医療用器具の洗浄に用いる。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 心臓、循環器系機能障害のある患者〔循環血液量を増すことから心臓に負担をかけ、症状が悪化するおそれがある。〕
- 腎障害のある患者〔水分、塩化ナトリウムの過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。〕

2. 副作用

(1) 副作用等発現状況の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

以下のような副作用が認められた場合には、投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

大量・急速投与：大量を急速投与すると、血清電解質異常、うっ血性心不全、浮腫、アシドーシスを起こすことがある。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、投与速度を緩徐にし、減量するなど注意すること。

4. 適用上の注意

(1) 調製時：

注射剤の溶解・希釈液として使用する場合は、生理食塩液が適切であることを確認すること。

(2) 投与前：

- 投与に際しては、感染に対する配慮をすること（患者の皮膚や器具消毒）。
- 寒冷期には体温程度に温めて使用すること。
- 開封後直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。

(3) 投与时：

- ゆっくり静注内に投与すること。
- 皮下注射する場合には、神経走行部位をさけるよう注意すること。
- 繰り返し皮下注射する場合には、注射部位を左右交互に変更するなど配慮すること。

なお、乳、幼、小児には連用しないことが望ましい。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名 塩化ナトリウム (Sodium Chloride)

分子式 NaCl

分子量 58.44

性状 無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末である。
水に溶けやすく、エタノール (99.5) にほとんど溶けない。

【取扱い上の注意】

- 包装内に水滴が認められるものや内容液が着色又は混濁しているものは使用しないこと。
- ポリエチレン製プラスチック容器の頭部を回転させて開封してください。このとき本体を強く握らないようにご注意ください。

【包装】

20mL × 60 管（ポリエチレン製プラスチック容器）

【文献請求先】

株式会社トライックス
東京都中央区築地 4-2-7
TEL 03-6226-5855
FAX 03-6226-5856

製造販売元（輸入元）



株式会社トライックス
東京都中央区築地4-2-7