

Nikko

速乾性すり込み式手指消毒剤

ゲルタイプ

消毒用 グルコジンハンドリキッド 0.2%

(0.2w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノール溶液)

Glucodine Hand Liquid 0.2% for Disinfection

2009年10月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	872619
承認番号	21700AMZ00370000
薬価収載	薬価基準対象外
販売開始	2009年10月

貯法：遮光した気密容器、火気を避けて保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

500mL

使用期限

製造番号

発売元 **日興製薬販売株式会社**
東京都千代田区神田紺屋町32番地

製造販売元 **ヤクハン製薬株式会社**
北海道北広島市北の里27番地

キャップ：PP
容器：PE
キャップール：PET
ポンプ袋：PE

【禁忌】(次の場合には使用しないこと)

- (1) クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者[過敏症の再発の可能性がある。]
- (2) 腫、膀胱、口腔等の粘膜面[クロルヘキシジン製剤の前記部位への使用により、ショック症状(初期症状：悪心・不快感・冷汗・めまい・胸内苦悶・呼吸困難・発赤等)の発現が報告されている。]
- (3) 損傷皮膚及び粘膜[エタノールを含有するので、損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

【組成・性状】

1. 組成

本品100mL中、下記の成分を含有する。

有効成分	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.2g
添加物	エタノール、アジピン酸ジイソブチル、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、アラントイン、ヒドロキシプロピルセルロース	

2. 製剤の性状

本品は無色～微黄色澄明な粘稠性の液で、エタノール臭がある。

【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	手指の消毒
用法・用量	本剤をそのまま用いる

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の場合には慎重に使用すること)

- (1) 薬物過敏症の既往歴のある患者
- (2) 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある患者

2. 重要な基本的注意

- (1) ショック等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。
- (2) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
- (3) 本剤の使用中に誤って眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。

消毒用グルコジンハンドリキッド0.2%

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用

ショック(頻度不明)があらわれることがあるので観察を十分にを行い、悪心・不快感・冷汗・めまい・胸内苦悶・呼吸困難・発赤等があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

種類・頻度	頻度不明
過敏症 ^(注1)	発疹・蕁麻疹等
皮膚 ^(注2)	刺激症状

注1)このような症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、再使用しないこと。

注2)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

4. 適用上の注意

(1) 投与経路：手指消毒以外の目的には使用しないこと。

(2) 使用時

- 1) 反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので、注意すること。
- 2) 血清・膿汁等の有機物は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分洗い落としてから使用すること。
- 3) 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落としてから使用すること。
- 4) 引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。

5. その他の注意

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与により、ショック症状を起こした患者のうち、数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的な IgE 抗体が検出されたとの報告がある。

【取扱い上の注意】

- (1) 本剤の付着した白布を次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミができることがある。漂白には過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。
- (2) 本剤はアルコールを含有しているため、床にごぼれ落ちると変色する場合があるので注意すること。

火気厳禁 アルコール類 危険等級Ⅱ 水溶性



JAN



GSI