



#### 《使用上の注意》

##### 1. 重要な基本的注意

- (1) 本剤の使用にあたっては、漢方処方における患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2) サンシシ含有製剤の長期投与(多くは5年以上)により、大腸の色調異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがある。長期投与する場合にあたっては、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行うことが望ましい。
- (3) 漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

##### 2. 副作用

###### 重大な副作用

腸間膜静脈硬化症：長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。

#### 〔貯 法〕

- 密閉容器

#### 〔取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 天然物ですので、若干色調の異なることがあります。ですが、効果には変わりありません。
- 開封後は、口をしっかりと閉めて、なるべく早く使用してください。