

殺菌消毒剤

日本薬局方

消毒用エタノール

Ethanol
for Disinfection

火気
厳禁

第4類アルコール類
水溶性
危険等級II

500mL

消毒用エタノール「トライックス」

※2017年7月改訂（第4版 製造販売元変更に伴う改訂）

※2016年9月改訂

日本標準商品分類番号	872615
承認番号	21600AMY00112000
薬価収載	2004年8月
販売開始	2014年1月

◇貯法：遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存

◇使用期限：ラベルに記載

【禁忌】（次の部位には使用しないこと）

損傷皮膚及び粘膜

（損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。）

※【組成・性状】

組成：エタノール（C₂H₅O）76.9～81.4vol%を含む。

性状：本品は無色澄明の液である。本品は水と混和する。本品は点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。本品は揮発性である。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、手術部位（手術野）の皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用量・用法】

本品をそのまま消毒部位に塗布する。

販売元

日本ジェネリック株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

※製造販売（輸入）元

株式会社グラフィコ

東京都中央区築地4-2-7

005

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意 (1) 眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合は直ちに水でよく洗い流してください。(2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類／頻度	頻度不明
過敏症※1	発疹等
皮膚※2	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3.適用上の注意 (1) 人体◇投与経路:外用にのみ使用すること。

◇使用時:同一部位 (皮膚面) に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。(2) その他◇使用時:本剤は、血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。◇器具等材質:(ア)合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装力テール等には、変質するものがあるので、長時間浸漬しないこと。(イ)金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐食を防止するために0.2～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。

4.その他の注意◇承認外の経皮的エタノール注入療法 (PEIT) 使用例で、注入時の疼痛、眩暈感、発熱、本剤の箇所外流出による重篤な拒絶・臓器内等の出血、肝硬変、肝不全等が報告されている。

【薬効薬理】

本剤は使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞(破傷菌、破傷風菌)及び一部のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用時等も含む)には十分注意すること。(2)衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。(3)開封時、容器の肩部又は底部を持ち、液がとびださないようにキャップをあけること。

※【文献請求先】

株式会社グラフィコ

TEL:03-6226-6557 FAX:03-6226-6558

GS1(調剤包装単位)

(01)04987792014087

GS1(販売包装単位)

(01)14987792287556

キャップ:PP
ボトル:PE

製造番号 (LOT)

使用期限 (EXP)

005