

皮膚軟化剤  
日本薬局方

# イオウ・カンフルローション

Sulfur and Camphor Lotion  
イオウ・カンフルローション「東豊」 500mL

月 日 開封  
月 日 期限

製造販売元  
東豊薬品株式会社  
東京都葛飾区西新小岩4-15-3

\*\* 2015年5月改訂(第6版)  
(日局に合わせ成分名称変更)  
\* 2012年11月改訂  
(販売元変更)

|            |               |
|------------|---------------|
| 日本標準商品分類番号 | 872669        |
| 承認番号       | 16000AMZ05459 |
| 薬価収載       | 2008年7月       |
| 販売開始       | 1977年10月      |
| 再評価結果      | 1983年4月       |

【貯 法】 (1) 気密容器  
(2) 開封後は冷所に保管すること。

【使用期限】 製造の翌月から3年

【注 意】 取扱い上の注意の項参照

【禁 忌】 (次の患者には使用しないこと)  
本剤に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

\*\* 組成: 1mL中 イオウ 60mg dl-カンフル 5mg  
添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、  
パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、  
エタノール及びpH調整剤を含む。

性状: 本品は淡黄色の懸濁液で、放置するとき、成分の一部を分離する。

【効能又は効果】 瘡瘡、酒皰

【用法及び用量】 1日2回患部に塗布する。朝は上清液、晩は混濁液を用  
いる。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施  
していない。

その他の副作用

|                   | 頻 度 不 明 |
|-------------------|---------|
| 過敏症 <sup>注)</sup> | 発赤、発疹等  |
| 皮 膚 <sup>注)</sup> | 皮膚炎     |

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

眼又は眼の周囲には使用しないこと。

【取扱い上の注意】

- (1) 本剤を小分けするときは容器をよく洗い、  
本剤をよく振り混ぜて、成分が均等にな  
るように小分けすること。
- (2) 使用時他の薬剤、化粧品が混入しない  
ようにすること。
- (3) 空気中の炭酸ガスを吸収して炭酸カル  
シウムの浮遊物がみられることがある。

【包装】

500mL

\*【問い合わせ先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター  
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21  
☎(0120)517-215  
FAX (076)442-8948

ボトル: PE  
キャップ: PP  
パッキン: PE

〈調剤包装単位用〉



〈販売包装単位用〉



製造番号

使用期限