

※※2018年4月改訂(第6版 販売中止に伴う改訂)

日本標準商品分類番号

87729

※2016年10月改訂

貯 法：室温保存

使用期限：直接の容器、外箱に表示(1年)

注 意：引火性(アクリルモノマー)

アレルギー性皮膚疾患の検査薬

## パッチテスト試薬(液)

規制区分	販売名	承認番号
処方箋医薬品 <sup>註</sup>	パッチテスト試薬アクリノール 0.1% パッチテスト試薬アクリルモノマー	(43AM)1803 (43AM)1804
劇薬 処方箋医薬品 <sup>註</sup>	パッチテスト試薬ホルマリン 5%	(43AM)1817
処方箋医薬品 <sup>註</sup>	パッチテスト試薬塩酸プロカイン 1%	(43AM)1836
	パッチテスト試薬塩酸キニーネ 1%	(43AM)1837
	パッチテスト試薬レゾルシン 5%	(43AM)1838
	パッチテスト試薬チメロサル 0.05%	(43AM)1842
	パッチテスト試薬テレピン油 20%	(43AM)1845
薬 価 収 載：1994年7月		
販 売 開 始：1969年5月		

注)注意－医師等の処方箋により使用すること

### ※※※【組成・性状】

販売名	組成		製剤の性状
	成分・含量(1mL中)	添加物(基剤)	
パッチテスト試薬 アクリノール 0.1%	(日局)アクリノール水和物 1mg含有	精製水	黄色澄明な液で、においはない。緑色のけい光を發する。
パッチテスト試薬 アクリルモノマー	メタクリル酸メチル 1mL含有	—	無色澄明の液で、特異なにおいがある。水に溶けにくくエタノール、ククロホルムに混和する。揮発性で引火しやすい。
パッチテスト試薬 ホルマリン 5%	(日局)ホルマリン 0.05mL含有	精製水	無色澄明の液で、わずかにホルムアルデヒド臭がある。
パッチテスト試薬 塩酸プロカイン 1%	(日局)プロカイン塩酸塩 10mg含有	精製水	無色澄明の液で味は苦く、舌を麻ひする。
パッチテスト試薬 塩酸キニーネ 1%	(日局)キニーネ塩酸塩水和物 10mg含有	精製水	無色澄明の液でにおいはなく、味は苦い。
* パッチテスト試薬 レゾルシン 5%	レゾルシン 50mg含有	精製水	無色～褐色澄明の液である。
パッチテスト試薬 チメロサル 0.05%	チメロサル 0.5mg含有	精製水	無色透明の液で、においはない。
パッチテスト試薬 テレピン油 20%	(日局)テレピン油 200mg含有	オリブ油	淡黄色の油で、特異の臭気がある。

### 【効能又は効果】

アレルギー性皮膚疾患のアレルゲンの確認

### 【用法及び用量】

本品1滴を適当な布等に滴加し、皮膚面に2日間貼付し、剥がしてから30分から1時間後及び1日後に反応を以下の基準により判定する。

なお、必要に応じて3～5日後にも同様に判定する。

- 反応なし
- ?+ 弱い紅斑
- + 紅斑+浸潤+ときに丘疹
- ++ 紅斑+浸潤+丘疹+小水疱
- +++ 大水疱

### ※※【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- (1)皮膚炎が急性期にある場合には、皮膚炎の増悪、汎発化をきたすことがあり、また皮膚の反応性が高まっているため非特異的の反応を起こしやすいのでパッチテストは行わないこと。
- (2)皮膚炎のある部位にはパッチテストを行わないこと。
- (3)パッチテストを行う2日前より副腎皮質ホルモンの内服又は注射を原則として避けること。
- (4)夏期に48時間貼付した場合、非特異的の反応が起こることがあるので注意すること。<sup>1)</sup>

#### 2. 副作用(頻度不明)<sup>2)</sup>

- (1)皮膚：掻痒、刺激反応、陽性反応の持続、色素沈着、色素脱失、皮膚炎の再燃、皮疹、膿疱、感染等を起こすおそれがある。
- (2)その他：感作されるおそれがある。

#### 3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので検査に際しては注意すること。

#### 4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性がある婦人には、診断上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

#### \* 5. 適用上の注意

パッチテスト施行時の注意

- (1)貼付部位は肩胛間部(脊椎を避けた両側)及び上肢屈側が最適である。
- (2)パッチテスト施行中は入浴及び過激な運動を避けさせること。

\*\*【有効成分に関する理化学的知見】

販売名	有効成分			
	成分	分子式	一般名	性状
パッチテスト試薬 アクリノール 0.1%	(日局)アクリノール水和物	$C_{15}H_{16}N_2O \cdot C_3H_5O_3 \cdot H_2O$	アクリノール水和物 Acrinol Hydrate (JAN)	本品は黄色の結晶性の粉末である。
パッチテスト試薬 アクリルモノマー	メタクリル酸メチル	$C_5H_8O_2$	メタクリル酸メチル	本品は無色透明の液で、特異なにおいがある。本品は水に溶けにくく、エタノール、クロロホルムに混和する。本品は揮発性で引火しやすい。
パッチテスト試薬 ホルマリン 5%	(日局)ホルマリン	(35.0~38.0%) $HCHO$	(35.0~38.0%) ホルマリン Formalin (JAN)	本品は無色透明の液で、そのガスは粘膜を刺激する。
パッチテスト試薬 塩酸プロカイン 1%	(日局)プロカイン塩酸塩	$C_{15}H_{20}N_2O_2 \cdot HCl$	プロカイン塩酸塩 Procaine Hydrochloride (JAN)	本品は白色の結晶又は結晶性の粉末である。
パッチテスト試薬 塩酸キニーネ 1%	(日局)キニーネ塩酸塩水和物	$C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot HCl \cdot 2H_2O$	キニーネ塩酸塩水和物 Quinine Hydrochloride Hydrate (JAN)	本品は白色の結晶で、においはなく、味は極めて苦い。
パッチテスト試薬 レゾルシン 5%	レゾルシン	$C_6H_6O_2$	レゾルシン Resorcin (JAN)	本品は白色又はうすい赤色の結晶又は粉末で、わずかに特異なにおいがあり、味は甘く後やや苦い。
パッチテスト試薬 チメロサル 0.05%	チメロサル	$C_9H_9HgNaO_2S$	チメロサル Thimerosal (JAN)、 Thiomersal (INN)	本品は白色~淡黄色の粉末で、わずかに特異なにおいがある。
パッチテスト試薬 テレピン油 20%	(日局)テレピン油		テレピン油 Turpentine Oil (JAN)	本品は無色~微黄色透明の液で、特異なにおいがあり、味は苦く刺激性である。

【包装】

5 mL

\*\*【主要文献】

- 1) 増田勉ほか：日本皮膚科学会雑誌, **80**(8), 515, 1970
- 2) 生野麻美子：皮膚, **33**(増11), 146, 1991

【文献請求先】

鳥居薬品株式会社 お客様相談室  
〒103-8439 東京都中央区日本橋本町3-4-1  
TEL 0120-316-834  
FAX 03-3231-6890

注：パッチテスト試薬ホルマリン5%は、日本薬局方ホルマリン5V/V%を含有する。  
なお、日本薬局方ホルマリンはホルムアルデヒド35.0~38.0%を含む。

製造  
販売元



鳥居薬品株式会社

東京都中央区日本橋本町3-4-1