

日本薬局方 キニジン硫酸塩水和物  
\*\*\* キニジン硫酸塩「ファイザー」原末  
QUINIDINE Sulfate [Pfizer]

\* キニジン硫酸塩錠 100mg「ファイザー」

QUINIDINE Sulfate Tablets 100mg [Pfizer]

キニジン硫酸塩水和物錠

貯 法：遮光、室温保存  
使用期限：最終年月を外箱等に記載  
(取扱い上の注意参照)

注) 注意 - 医師等の処方箋により使用すること

	末	錠
承認番号	23100AMX00091	22600AMX00202
薬価収載	2019年6月	2014年12月
販売開始	1956年9月	1973年1月
再評価結果		1975年10月

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

- 刺激伝導障害（房室ブロック、洞房ブロック、脚ブロック等）のある患者〔失神発作あるいは突然死をおこすおそれがある。〕
- 重篤なうつ血性心不全のある患者〔本疾患を悪化させるおそれがある。〕
- 高カリウム血症のある患者〔心疾患を悪化させるおそれがある。〕
- 本剤に過敏症の既往歴のある患者
- アミオダロン塩酸塩（注射）、バルデナフィル塩酸塩水和物、トレミフェンクエン酸塩、キヌプリスチン・ダルホプリスチン、ポリコナゾール、サキナビルメシル酸塩、ネルフィナビルメシル酸塩、リトナビル、モキシフロキサシン塩酸塩、イトラコナゾール、フルコナゾール、ホスフルコナゾール、ミコナゾール、メフロキン塩酸塩を投与中の患者〔「相互作用」の項参照〕

【組成・性状】

1.組成

販売名 成分	キニジン硫酸塩 「ファイザー」原末	キニジン硫酸塩錠100mg 「ファイザー」
有効成分	1g中	1錠中
	日局 キニジン硫酸塩水和物 1g	日局 キニジン硫酸塩水和物 100.00mg
添加物		乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ポビドン、ステアリン酸マグネシウム

2.性状

キニジン硫酸塩「ファイザー」原末：本剤は白色の結晶で、においはなく、味は極めて苦い。

販売名	外形		
	上面	下面	側面
キニジン硫酸塩錠100mg 「ファイザー」			
	直径 9.0mm	厚さ 3.3mm	重量 250mg

【効能・効果】

期外収縮（上室性、心室性）  
発作性頻拍（上室性、心室性）  
新鮮心房細動、発作性心房細動の予防、陳旧性心房細動  
心房粗動  
電気ショック療法との併用及びその後の洞調律の維持  
急性心筋梗塞時における心室性不整脈の予防

【用法・用量】

経口的に投与するが、著明な副作用を有するので、原則として入院させて用いる。  
本剤の投与法は心房細動の除去を目的とする場合を標準とし、漸増法と大量投与法に大別できる。その他の不整脈に対しては、原則として少量持続投与でよく、この場合には外来にて投与してもよい。

1.試験投与

治療に先立ち、1回量0.1～0.2g（1～2錠）を経口投与し、副作用があらわれた時は、投与を中止する。副作用を調べる際には血圧測定と心電図記録を行う必要がある。

2.漸増法

成人における慢性心房細動に対しては、例えばキニジン硫酸塩水和物として、1回量0.2g（2錠）を最初1日3回（6～8時間おき）に投与し、効果がない場合は、2日目ごとに1回量を0.4g（4錠）、0.6g（6錠）のごとく増すか、投与回数を1～2日目ごとに4、5、6回のごとく増す。不整脈除去効果が得られたら、そこで維持量投与に切りかえ、あるいは投与を中止する。6日間投与して効果がない場合、途中で副作用があらわれた場合には、投与を中止すること。本剤は昼間のみ与えるのが原則である。

3.大量投与

はじめから大量を与え、投与期間の短縮をはかるもので、成人における慢性心房細動に対しては、例えばキニジン硫酸塩水和物として、1回量0.4g（4錠）を1日5回、3日間与え、効果がない場合には投与を中止する。効果が得られた場合の維持投与は漸増法と同様である。わが国では漸増法でよいとする報告が多い。

4.維持量投与

キニジン硫酸塩水和物として、通常、成人1日量0.2～0.6g（2～6錠）を1～3回に分割経口投与するが、個人差が大きい。電気ショック療法との併用及びその後の洞調律の維持に対する用量もこれに準ずる。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1.慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 基礎心疾患（心筋梗塞、弁膜症、心筋症等）のある患者〔類似薬で心室頻拍、心室細動が発現した報告がある。〕
- うつ血性心不全のある患者〔本疾患を悪化させるおそれがある。〕
- 重篤な肝・腎機能障害のある患者〔本剤の排泄が低下し、副作用の発現が増大するおそれがある。〕
- 塞栓の既往歴や一過性脳虚血発作等の症状のある患者〔心房細動・粗動から洞調律に回復した時、塞栓をおこすことがある。〕
- 高齢者〔「高齢者への投与」の項参照〕
- 血清カリウム低下のある患者〔多形性の心室頻拍の発現の危険性が増大する。〕

2.重要な基本的注意

- 本剤は著明な副作用を有するので、原則として入院させて用いること。
- 本剤の投与に際しては、頻回に患者の状態を観察し、心電図、脈拍、血圧、心胸比を定期的に調べること。PQの延長、QRS幅の増大、QTの延長、徐脈、血圧低下等の異常所見が認められた場合には、直ちに減量または投与を中止すること。なお、大量投与時には心電図を持続的に監視することが望ましい。特に、次の患者または場合には、少量から開始するなど投与量に十分注意するとともに、頻回に心電図検査を実施すること。

1) うつ血性心不全のある患者または基礎心疾患（心筋梗塞、弁膜症、心筋症等）があり、心不全をきたすおそれのある患者  
[心室頻拍、心室細動等が発現するおそれが高い。]

2) 高齢者〔「高齢者への投与」の項参照〕

3) 他の抗不整脈薬との併用〔有効性、安全性が確立していない。〕

### 3. 相互作用

#### (1) 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アミオダロン塩酸塩(注射) アンカロン注	併用により Torsade de pointes を起こすことがある。	併用により QT 延長作用が相加的に増加することがある。
バルデナフィル塩酸塩水和物 レビトラ	QT 延長等があらわれるおそれがある。	相互に QT 延長を増強することが考えられる。
トレミフェンケン酸塩 フェアストン	QT 延長を増強し、心室性頻拍 (Torsade de pointes を含む) 等を起こすおそれがある。	本剤は QT 間隔を延長させるおそれがあるため。
キヌプリスチン・ダルホブリスチン シナシッド	QT 延長等があらわれるおそれがある。	左記薬剤の肝薬物代謝酵素 (CYP3A4) 阻害作用により、本剤の代謝が阻害され、血中濃度が上昇するおそれがある。
ボリコナゾール ブイフェンド	QT 延長等があらわれるおそれがある。	左記薬剤の肝薬物代謝酵素 (CYP3A4) 阻害作用により、本剤の代謝が阻害され、血中濃度が上昇するおそれがある。
サキナビルメシリ酸塩 インビラーゼ	本剤の血中濃度が増加し、重篤又は生命に危険を及ぼすような心血管系の副作用 (QT 延長等) を起こすおそれがある。	チトクローム P450 (CYP3A4) に対する競合による。
ネルフィナビルメシリ酸塩 ビラセプト リトナビル ノービア	不整脈、血液障害、痙攣等の重篤な副作用をおこすおそれがある。	左記薬剤の肝薬物代謝酵素 (CYP3A4) に対する競合的阻害作用により、本剤の血中濃度が大幅に上昇するおそれがある。
モキシフロキサシン塩酸塩 アバロックス	QT 延長等があらわれるおそれがある。	相互に QT 延長を増強することが考えられる。
イトラコナゾール イトリゾール	本剤の作用が増強するおそれがある。	左記薬剤のチトクローム P450 に対する競合的阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。
フルコナゾール ジフルカン ホスフルコナゾール プロジフ	本剤の血中濃度が上昇することにより、QT 延長、Torsade de pointes を発現するおそれがある。	左記薬剤は本剤の肝臓における主たる代謝酵素であるチトクローム P450 3A4 を阻害するので、併用により本剤の血中濃度が上昇することがある。
ミコナゾール フロリードF注 フロリードゲル経口用	QT 延長等があらわれるおそれがある。	左記薬剤の肝薬物代謝酵素 (CYP3A4) 阻害作用により、本剤の代謝が阻害され、血中濃度が上昇するおそれがある。
メフロキン塩酸塩 メファキン	急性脳症候群、暗赤色尿、呼吸困難、貧血、溶血。	併用投与により心臓に対して累積的に毒性を与える可能性がある。

#### (2) 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
フェニトイイン	本剤の作用が減弱することがある。	左記薬剤の肝薬物代謝酵素誘導作用により、本剤の代謝が促進され、血中濃度が低下することがある。
トラマドール塩酸塩	相互に作用が増強するおそれがある。	機序不明
メロキシカム	左記薬剤の作用が減弱するおそれがある。	機序は十分に解明されていないが、本剤が左記薬剤の代謝を亢進させた (in vitro 試験) との報告がある。
三環系抗うつ剤 イミプラミン塩酸塩 クロミプラミン塩酸塩 ロフェプラミン塩酸塩等	左記薬剤の作用を増強することがある。	本剤の肝薬物代謝酵素阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、血中濃度が上昇することがある。
デュロキセチン塩酸塩	左記薬剤の血中濃度が上昇することがあるので、左記薬剤の用量を減量するなど注意して投与すること。	本剤の CYP2D6 阻害作用により、左記薬剤の血中濃度が上昇することがある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ドネペジル塩酸塩	左記薬剤の作用が増強するおそれがある。	本剤の肝薬物代謝酵素阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、血中濃度が上昇するおそれがある。
骨格筋弛緩剤 ツボクラリン パンクロニウム臭化物 ベクロニウム臭化物等	左記薬剤の作用を増強させることがある。	機序不明
チモロールマレイン酸塩	$\beta$ 遮断作用 (心拍数減少、徐脈) の増強が報告されている。	本剤の肝薬物代謝酵素阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、血中濃度が上昇することがある。
ジギタリス製剤 ジゴキシン ジギトキシン メチルジゴキシン等	左記薬剤、本剤の副作用がともに増大することがある。	左記薬剤と本剤との間には競合排泄現象が認められている。
アミオダロン塩酸塩(経口)	致死的な心室性不整脈等があらわれることがあるので、必要に応じて本剤を減量するなど慎重に投与すること。	本剤の血中濃度が上昇することがある。
アプリンジン塩酸塩 フレカニド酢酸塩 メキシレチン塩酸塩	動物実験において左記薬剤の作用が増強するとの報告がある。	機序不明
メトプロロール酒石酸塩	左記薬剤の作用が増強するおそれがある。	本剤の肝薬物代謝酵素 (CYP2D6) 阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、血中濃度が上昇することがある。
ポビンドロールマロン酸塩	過度の心機能抑制があらわれることがあるので、用量に注意すること。 左記薬剤の血漿中濃度を上昇させるおそれがある。	共に心機能抑制作用を有するため。 本剤の CYP2D6 阻害作用により、左記薬剤の代謝が遅延する。
ペラバミル塩酸塩	致死的な心室性不整脈等があらわれることがあるので、必要に応じて本剤を減量するなど慎重に投与すること。	本剤の血中濃度が上昇することがある。
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	左記薬剤の作用が増強するおそれがある。	本剤の肝薬物代謝酵素 (CYP2D6) 阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、血中濃度が上昇することがある。
ロベラミド塩酸塩	左記薬剤の血中濃度が上昇することがある。	機序不明
尿アルカリ化剤 乾燥水酸化アルミニウム ゲル 炭酸水素ナトリウム等	本剤の作用が増強するおそれがある。	左記薬剤の尿中 pH を上昇させる作用により、本剤の尿中排泄率が低下し、血中濃度が上昇することがある。
ワルファリンカリウム	左記薬剤の抗凝血作用を増強させることがある。	機序不明
三酸化ヒ素	QT 延長、心室性不整脈 (Torsade de pointes を含む) を起こすおそれがある。	左記薬剤及び本剤はいずれも QT 延長あるいは心室性不整脈 (Torsade de pointes を含む) を起こすことがある。
スニチニブリソング酸塩	QT 間隔延長、心室性不整脈 (Torsade de pointes を含む) 等の重篤な副作用を起こすおそれがある。	左記薬剤及び本剤はいずれも QT 間隔を延長させるおそれがあるため、併用により作用が増強するおそれがある。
ダサチニブ水和物	QT 間隔延長作用を増強する可能性がある。	左記薬剤及び本剤はいずれも QT 間隔を延長させるおそれがあるため、併用により作用が増強する可能性がある。
ラバチニブチル酸塩水和物	左記薬剤の血中濃度や分布に影響を与える可能性がある。	左記薬剤は P-糖蛋白質の基質であることが示されている。
	QT 間隔延長を起こす又は悪化させるおそれがある。	左記薬剤及び本剤はいずれも QT 間隔を延長させるおそれがあり、併用により作用が増強する可能性がある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
エリスロマイシン	血中濃度上昇に伴うQT延長、心室性不整脈（Torsade de pointesを含む）等が報告されているので、慎重に投与すること。	左記薬剤の肝薬物代謝酵素（CYP3A4）に対する競合的阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇することがある。
リファンピシン	本剤の作用が减弱することがある。	左記薬剤の肝薬物代謝酵素誘導作用により、本剤の代謝が促進され、血中濃度が低下することがある。
塩酸シプロフロキサシン	左記薬剤を併用した場合、相加的なQT延長がみられるおそれがある。	機序不明
メシリ酸ガレノキサシン水和物	QT延長、心室性不整脈（Torsade de pointesを含む）があらわれるおそれがある。	本剤の単独投与で、QT延長作用がみられている。
エトラビリン	本剤の血中濃度が低下する可能性があるため、注意して投与すること。	左記薬剤のCYP3A4誘導作用により、本剤の代謝が促進される。
ダルナビルエタノール付加物	本剤の血中濃度を上昇させる可能性がある。	左記薬剤及びリトナビルのCYP3A4に対する阻害作用により、本剤の代謝が阻害される。
ホスアンプレナビルカルシウム水和物	本剤の血中濃度が上昇する可能性があるので、血中濃度のモニタリングを行うことが望ましい。	アンプレナビルと本剤はCYP3A4で代謝されるため、併用により代謝が競合的に阻害される。
セイヨウオトギリソウ（St. John's Wort, セント・ジョンズ・ワート）含有食品	本剤の代謝が促進され血中濃度が低下するおそれがあるので、本剤投与時はセイヨウオトギリソウ含有食品を摂取しないよう注意すること。	セイヨウオトギリソウにより誘導された肝薬物代謝酵素（チトクロームP450）が本剤の代謝を促進し、クリアランスを上昇させるためと考えられている。

#### 4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

##### (1)重大な副作用（頻度不明）

1) **高度伝導障害、心停止、心室細動**：これらの致死性の不整脈が突然発現することがある。したがって毎日数回心電図を記録し、QRS幅の増大、あるいは期外収縮の発生数の増加、心室頻拍、P波の消失が認められた場合には投与を中止すること。

2) **心不全**：心筋の収縮力を低下させ、心不全、血圧低下をおこすことがあるので、このような場合には投与を中止すること。

3) **SLE様症状**：このような症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、この様な症状があらわれた場合には投与を中止すること。

4) **無顆粒球症、白血球減少、再生不良性貧血、溶血性貧血**：このような副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止すること。

5) **血小板減少性紫斑病**：このような副作用があらわれがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止すること。

##### (2)その他の副作用

	頻度不明
<b>精神神経系</b>	めまい、頭痛、耳鳴、難聴、視力障害、複視、羞明、色覚異常
<b>消化器</b>	恶心、嘔吐、腹痛、下痢、食欲不振
<b>肝臓<sup>(注1)</sup></b>	黄疸等の肝障害
<b>過敏症<sup>(注2)</sup></b>	発疹、発熱、脈管性浮腫、血圧低下、光線過敏症

注1：定期的に肝機能検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止すること。

注2：このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

#### 5. 高齢者への投与

高齢者では、肝・腎機能が低下していることが多く、また、体重が少ないと傾向があるなど副作用が発現しやすいので慎重に投与すること。[「重要な基本的注意」の項参照]

#### 6. 妊婦・産婦・授乳婦等への投与

(1) 妊婦または妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

(2) 本剤投与中は授乳をさけさせること。[ヒト母乳中へ移行することが報告されている。]

#### 7. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。

#### 8. 過量投与

**徵候、症状**：高度伝導障害・心停止・心室細動等の致死性の不整脈、低血圧があらわれることがある。

**処置**：催吐または胃洗浄を行い、症状に応じて処置を行う。

#### 9. 適用上の注意（キニジン硫酸塩錠のみ）

**薬剤交付時**：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]

#### 【薬効薬理】

本剤はNa<sup>+</sup>チャネルを遮断し、細胞内へのNa<sup>+</sup>の流入を抑制することにより、心房筋、心室筋、ペルキンエ線維における活動電位第0相の立ち上がりを抑制して、刺激伝導を遅延させる。また活動電位持続時間と有効不応期を延長し、心筋の自動性を低下させ、かつ刺激に対する閾値を上昇させることで、異所性自動能に基づく不整脈の発生を抑制する。迷走神経遮断作用があり、このため心拍数を増加させるが、この作用は上記の諸作用に比べて非常に弱い<sup>1)</sup>。

#### 【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：キニジン硫酸塩水和物（Quinidine Sulfate Hydrate）

化学名：(9S)-6'-Methoxycinchonan-9-ol hemisulfate monohydrate

分子式：(C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> · H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> · 2H<sub>2</sub>O

分子量：782.94

構造式：



性状：白色の結晶で、においはなく、味は極めて苦い。

エタノール（95）又は熱湯に溶けやすく、水にやや溶けにくく、ジエチルエーテルにはほとんど溶けない。また、乾燥物はクロロホルムに溶けやすい。

光によって徐々に暗色となる。

旋光度 [α]<sub>D</sub><sup>20</sup> : +275~+287° (乾燥後、0.5g、0.1mol/L塩酸、25mL、100mm)

#### 【包裝】

キニジン硫酸塩「ファイザー」原末：25g

キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」：100錠、1000錠（PTP）

500錠（バラ）

#### 【主要文献】

1) 日本薬局方医薬品情報：506, じほう, 2011

[L20140715018]

#### 【文献請求先】

ファイザー株式会社 製品情報センター

〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7

学術情報ダイヤル 0120-664-467

FAX 03-3379-3053



【製造販売元】  
**マイラン製薬株式会社**  
大阪市中央区本町2丁目6番8号  
【販売】  
**ファイザー株式会社**  
東京都渋谷区代々木3-22-7

