

貯 法：室温保存
有効期間：3年
劇薬
処方箋医薬品^{注)}

注意欠陥／多動性障害治療剤
(選択的 α_2 Aアドレナリン受容体作動薬)
グアンファシン塩酸塩徐放錠
グアンファシン徐放錠1mg^{明治}
グアンファシン徐放錠3mg^{明治}
GUANFACINE Extended Release Tablets MEIJ

	承認番号	販売開始
1mg	30800AMX00266000	
3mg	30800AMX00267000	

注)注意－医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5参照]
2.3 房室ブロック(第二度、第三度)のある患者[本剤の中樞性の徐脈作用により症状が悪化するおそれがある。][11.1.3参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	有効成分(1錠中)	添加剤
グアンファシン徐放錠1mg ^{明治}	グアンファシン塩酸塩1.14mg(グアンファシンとして1mg)	乳糖水和物、グリセリン脂肪酸エステル、乾燥メタクリル酸コポリマーLD、結晶セルロース、ヒプロメロース、コハク酸、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム
グアンファシン徐放錠3mg ^{明治}	グアンファシン塩酸塩3.42mg(グアンファシンとして3mg)	乳糖水和物、グリセリン脂肪酸エステル、乾燥メタクリル酸コポリマーLD、結晶セルロース、ヒプロメロース、コハク酸、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、黄色三二酸化鉄、青色2号アルミニウムレーキ

3.2 製剤の性状

販売名	剤形	色	外形		
			表	裏	側面
グアンファシン徐放錠1mg ^{明治}	素錠(徐放錠)	白色			
			直径(mm)	厚さ(mm)	重量(mg)
			7.1	4.2	150.0
グアンファシン徐放錠3mg ^{明治}	素錠(徐放錠)	淡緑白色			
			直径(mm)	厚さ(mm)	重量(mg)
			7.9	4.3	190.0

4. 効能・効果

注意欠陥／多動性障害(AD/HD)

5. 効能・効果に関連する注意

- 5.1 本剤の6歳未満の患者における有効性及び安全性は確立していない。[9.7、17.1.1、17.1.2参照]
5.2 AD/HDの診断は、米国精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM[※])等の標準的で確立した診断基準に基づき慎重に実施し、基準を満たす場合にのみ投与すること。
※：Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

6. 用法・用量

〈18歳未満の患者〉

通常、体重50kg未満の場合はグアンファシンとして1日1mg、体重50kg以上の場合はグアンファシンとして1日2mgより投与を開始し、1週間以上の間隔をあけて1mgずつ、下表の維持用量まで増量する。
なお、症状により適宜増減するが、下表の最高用量を超えないこととし、いずれも1日1回経口投与すること。

体重	開始用量	維持用量	最高用量
17kg以上25kg未満	1mg	1mg	2mg
25kg以上34kg未満	1mg	2mg	3mg

体重	開始用量	維持用量	最高用量
34kg以上38kg未満	1mg	2mg	4mg
38kg以上42kg未満	1mg	3mg	4mg
42kg以上50kg未満	1mg	3mg	5mg
50kg以上63kg未満	2mg	4mg	6mg
63kg以上75kg未満	2mg	5mg	6mg
75kg以上	2mg	6mg	6mg

〈18歳以上の患者〉

通常、グアンファシンとして1日2mgより投与を開始し、1週間以上の間隔をあけて1mgずつ、1日4～6mgの維持用量まで増量する。
なお、症状により適宜増減するが、1日用量は6mgを超えないこととし、いずれも1日1回経口投与すること。

7. 用法・用量に関連する注意

- 7.1 CYP3A4/5阻害剤を投与中の患者、重度の肝機能障害のある患者又は重度の腎機能障害のある患者に投与する場合には、1日1mgより投与を開始すること。[9.2.1、9.3.1、10.2、16.6.1、16.7.1参照]
7.2 本剤の投与を中止する場合は、原則として3日間以上の間隔をあけて1mgずつ、血圧及び脈拍数を測定するなど患者の状態を十分に観察しながら徐々に減量すること。本剤の急な中止により、血圧上昇及び頻脈があらわれることがある。[9.1.2参照]

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤を投与する医師又は医療従事者は、投与前に患者(小児の場合には患者及び保護者又はそれに代わる適切な者)に対して、本剤の治療上の位置づけ及び本剤投与による副作用発現等のリスクについて、十分な情報を提供するとともに、適切な使用方法について指導すること。
8.2 本剤を長期間投与する場合には、定期的に有用性の再評価を実施し、漫然と投与しないよう注意すること。
8.3 高度な血圧低下及び脈拍数減少が認められ、失神に至る場合があるので、本剤の投与開始前及び用量変更の1～2週間後には、血圧及び脈拍数を測定すること。至適用量の決定後にも4週に1回を目途に血圧及び脈拍数を測定すること。また、本剤の投与による脱水に十分注意し、脱水の症状があらわれた場合には、補液等適切な措置を講じること。[11.1.1参照]
8.4 心血管系への影響(高度な徐脈、低血圧、QT延長等)があらわれる可能性があるため、本剤投与開始前及び投与中は以下の点に注意すること。[11.1.1-11.1.3、17.3.1参照]
・本剤投与開始前には心電図異常の有無について確認すること。心電図異常が認められた場合は、投与の可否を慎重に判断すること。
・心血管疾患若しくはその既往歴がある場合又は本剤投与開始前に心電図異常が認められた場合は、定期的に心電図検査を行うなど、患者の状態を慎重に観察すること。[9.1.1、9.1.3参照]
・本剤投与中は心血管系の状態に注意し、心血管系への影響を示唆する症状(徐脈、失神、ふらつき、動悸等)があらわれた場合には心電図検査等を行い、適切な処置を行うこと。
8.5 本剤の投与開始時及び用量調節時に副作用(傾眠、血圧低下等)により投与中止に至った症例が認められていることから、本剤の投与中(特に投与開始時及び用量調節時)においては、患者の状態を慎重に観察し、用量の調節を行うこと。
8.6 自殺念慮や自殺行為があらわれることがあるので、患者の状態を注意深く観察すること。また、患者(小児の場合には患者及び保護者又はそれに代わる適切な者)に対し、これらの症状・行為があらわれた場合には、速やかに医療機関に連絡するよう指導すること。
8.7 攻撃性、敵意はAD/HDにおいてしばしば観察されるが、本剤

- の投与中にも攻撃性、敵意の発現が報告されている。投与中は、攻撃的行動、敵意の発現又は悪化について観察すること。
- 8.8 眠気、鎮静等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないように注意すること。
- 8.9 本剤の投与により体重増加を来すことがあるので、定期的に体重を測定し、肥満の徴候があらわれた場合は、食事療法、運動療法等の適切な処置を行うこと。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 低血圧、起立性低血圧、徐脈、心血管疾患のある患者又はその既往歴のある患者、血圧を低下又は脈拍数を減少させる作用を有する薬剤を投与中の患者

血圧及び心拍数を低下させることがある。[8.4参照]

9.1.2 高血圧のある患者又はその既往歴のある患者

本剤を急に中止した場合、血圧上昇があらわれることがある。[7.2参照]

9.1.3 不整脈又はその既往歴のある患者、先天性QT延長症候群の患者又はQT延長を起こすことが知られている薬剤を投与中の患者

本剤の投与によりQT延長があらわれるおそれがある。[8.4、17.3.1参照]

9.1.4 狭心症及び心筋梗塞等の虚血性心疾患のある患者又はその既往歴のある患者

急激な血圧低下があらわれた場合、冠血流量が減少し虚血性心疾患が悪化するおそれがある。

9.1.5 脳梗塞等の脳血管障害のある患者

急激な血圧低下があらわれた場合、脳血流量が減少し症状が悪化するおそれがある。

9.1.6 抑うつ状態の患者

本剤の鎮静作用により、症状が悪化するおそれがある。

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重度の腎機能障害のある患者

本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。[7.1、16.6.1参照]

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 重度の肝機能障害のある患者

本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。[7.1参照]

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。動物実験(マウス)において大量投与により催奇形作用(外脳症、脊椎破裂症)が報告されている。[2.2参照]

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験(ラット)で乳汁中への移行が報告されている。

9.7 小児等

6歳未満の患者を対象とした臨床試験は実施していない。[5.1、17.1.1、17.1.2参照]

10. 相互作用

本剤は、主に肝代謝酵素CYP3A4及びCYP3A5で代謝される。[16.4.2参照]

10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
CYP3A4/5阻害剤 イトラコゾール、 リトナビル、クラリスロマイシン等 [7.1、16.7.1参照]	本剤の血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがあるの で、本剤を減量する など注意すること。	これらの薬剤により、本 剤の代謝が阻害される可 能性がある。ケトコナ ゾール(経口剤、国内未 発売)との併用により、 本剤のAUCが3倍増加し た。
CYP3A4/5誘導剤 リファンピシン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェントイン等 [16.7.2参照]	本剤の血中濃度が減少し、作用が減弱するおそれがある。	これらの薬剤により、本 剤の代謝が促進される可 能性がある。リファンピ シンの併用により、本 剤のAUCが約70%減少 した。
中枢神経抑制剤 鎮静剤、催眠剤、抗 精神病薬、フェノチ アジン誘導体、バル ビツール酸誘導体、 ベンゾジアゼピン誘 導体等 アルコール	相互に作用を増強する ことがある。	これらの薬剤により、本 剤の鎮静作用が増強され る可能性がある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
バルプロ酸	バルプロ酸の血中濃 度が増加したとの報 告がある。	機序は不明である。
降圧作用を有する薬剤 β 遮断剤、Ca拮抗 剤、ACE阻害剤、アン ジオテンシンⅡ受 容体拮抗剤、降圧利 尿剤等	相互に作用を増強 し、失神を起こすこ とがある。	これらの薬剤により、本 剤の降圧作用及び徐脈作 用が増強される可能性 がある。
心拍数減少作用を有す る薬剤 ジギタリス製剤等		

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 低血圧(20.5%^{注)})、徐脈(14.9%^{注)})

高度な低血圧、徐脈があらわれ、失神に至る場合がある。[8.3、8.4参照]

11.1.2 失神(頻度不明)

[8.4参照]

11.1.3 房室ブロック(0.5%未満)

[2.3、8.4参照]

11.2 その他の副作用

種類\頻度	5%以上	1～5%未満	1%未満	頻度不明
過敏症				過敏症、発疹、そう痒
循環器		起立性低血 圧	血圧上昇、頻 脈、洞性不整 脈	蒼白、高血圧 性脳症、QT 延長
精神神経系	傾眠 (49.8%)、頭痛、不眠、めまい ^{注)}		易刺激性、悪夢、感情不安定、激越、鎮静、無力症	不安、うつ病、嗜眠、痙攣、過眠症、幻覚
消化器	口渇 ^{注)} 、便秘	腹痛、食欲減退、悪心、下痢	腹部不快感、嘔吐、消化不良	
その他	倦怠感	遺尿、体重増加	頻尿、胸痛、ALT上昇	喘息、脱水、勃起不全

^{注)}18歳未満の患者より18歳以上の患者で特に高頻度に発現が認められた副作用

13. 過量投与

13.1 症状

低血圧、徐脈、QT延長、投与初期の一過性高血圧、嗜眠、呼吸抑制等があらわれることがある。

13.2 処置

本剤は透析により除去されない。嗜眠が発現した場合は、昏睡、徐脈及び低血圧等のより重篤な毒性が遅れて発現する可能性があるため、処置を行った上で少なくとも24時間観察すること。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

14.1.1 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

14.1.2 本剤は徐放性製剤であるため、割ったり、砕いたり、すりつぶしたりしないで、そのままかまずに服用するよう指導すること。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 健康成人

健康成人男性8例に2mg、4mg及び6mgを漸増法でそれぞれ1日1回空腹時5日間、計15日間反復経口投与したときの各投与量における投与5日目の薬物動態パラメータを表1に示す。投与後5～8時間(中央値)でC_{max}に達し、C_{max}及びAUCはほぼ用量に比例して増加した。また、反復投与開始後約5日で定常状態に達した¹⁾。

表1 健康成人における薬物動態パラメータ
(反復投与：各投与量における投与5日目)

投与量 (mg)	例数	C _{max} *1 (ng/mL)	AUC _{0-τ} *1 (ng・hr/mL)	T _{max} *2 (hr)
2	8	2.70 (0.552)	46.08 (10.47)	5 (5-8)
4		7.71 (3.30)	139.4 (58.16)	6.5 (5-12)
6		11.7 (2.44)	213.0 (45.79)	8 (5-8)

*1：算術平均値(標準偏差)

*2：中央値(最小値-最大値)

16.1.2 小児患者

日本人小児及び外国人小児AD/HD患者(392例)から得られた血漿中グアンファシン濃度データ(3231ポイント)を用いて母集団薬物動態解析を行った。その結果、見かけの全身クリアランス及び見かけの分布容積に対して体重が統計学的に有意な共変量であった。また、日本人児童患者160例(6～12歳)及び青少年患者31例(13～17歳)にそれぞれ0.04mg/kg^{注1)}、0.08mg/kg及び0.12mg/kgを1日1回経口投与したとき、母集団薬物動態解析の結果に基づき推定した薬物動態パラメータは表2のとおりである²⁾。

注1)本剤の承認された最高用量は6mgである。

表2 小児患者における推定薬物動態パラメータ*
(定常状態)

投与群	児童(6～12歳)			青少年(13～17歳)		
	例数	C _{max} (ng/mL)	AUC _{0-τ} (ng・hr/mL)	例数	C _{max} (ng/mL)	AUC _{0-τ} (ng・hr/mL)
0.04 mg/kg	54	2.47 (1.51-3.92)	45.59 (26.86-76.07)	11	2.92 (2.06-4.23)	54.32 (29.73-88.48)
0.08 mg/kg	52	5.00 (2.31-7.48)	90.40 (31.44-152.9)	10	6.57 (5.11-9.08)	129.1 (91.42-197.7)
0.12 mg/kg	54	7.49 (5.02-11.3)	132.1 (90.82-232.2)	10	10.0 (6.56-12.9)	200.5 (120.8-272.6)

*：中央値(最小値-最大値)、母集団薬物動態パラメータを用いたベジアン推定値

16.1.3 生物学的同等性試験

グアンファシン徐放錠3mg「明治」とインチュニブ錠3mgを、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(グアンファシンとして3mg)健康成人男子に絶食若しくは食後単回経口投与して血漿中グアンファシン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、C_{max})について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、いずれもlog(0.80)～log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された³⁾。




図1 3mg徐放錠投与時の血漿中グアンファシン濃度推移(絶食)




図2 3mg徐放錠投与時の血漿中グアンファシン濃度推移(食後)

表3 薬物動態パラメータ

		被験者数	判定パラメータ		参考パラメータ	
			AUC _t (ng・hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	T _{1/2} (hr)
絶食投与	グアンファシン徐放錠3mg「明治」	44	63.16±24.07	2.51±0.97	4.7±1.3	13.6±4.1
	インチュニブ錠3mg	44	63.15±25.24	2.43±0.88	4.4±1.4	13.7±3.9
食後投与	グアンファシン徐放錠3mg「明治」	101	82.29±26.33	3.18±0.76	6.1±2.7	13.5±3.1
	インチュニブ錠3mg	101	91.74±26.85	3.51±0.77	7.6±3.2	13.1±1.9

Mean±S.D.

血漿中濃度並びにAUC、C_{max}等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 食事の影響

健康成人140例を対象に、3mg(1mg錠3錠あるいは3mg錠1錠)単回投与時の食事の影響を検討したところ、空腹時投与に比べて食後投与(高脂肪食)ではC_{max}は約1.2～1.4倍高く、AUCは約1.2～1.3倍高かった⁴⁾。

16.3 分布

16.3.1 蛋白結合率

ヒト血漿蛋白結合率は、約70%である⁵⁾。

16.4 代謝

16.4.1 代謝経路

グアンファシンの主要な代謝経路は、芳香環における水酸化、それに続くグルクロン酸抱合又は硫酸抱合であると推定された。健康成人男性11例に4mgを反復経口投与したとき、ヒドロキシグアンファシンの硫酸抱合体及びヒドロキシグアンファシンのグルクロン酸抱合体が血漿中の代謝物として検出された⁶⁾。

16.4.2 代謝酵素

In vitro 試験の結果、グアンファシンの酸化的代謝に関する主な代謝酵素はCYP3A4/5と推定された⁷⁾。[10.参照]

16.5 排泄

グアンファシンは肝臓と腎臓の両方を介して消失する⁵⁾。健康成人男性11例に1mgを単回経口投与したときのT_{1/2}の算術平均値(標準偏差)は、18.4時間(7.52)であった。また、1mg単回(投与後72時間まで)及び4mg反復(5日目投与後24時間まで)投与時のグアンファシンの累積尿中排泄率は、投与量の40.9%及び36.0%であった¹⁸⁾。

In vitro 試験において、グアンファシンはOCT2(有機カチオントランスポーター2)の基質であることが示された。

In vitro 試験において、グアンファシンのMATE1に対する阻害作用(IC₅₀値：0.168μmol/L)が認められた⁹⁾。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎機能障害患者

腎機能障害者(被験者群：10mL/min≤糸球体ろ過量≤30mL/min、糸球体ろ過量<10mL/min、各群6例)にグアンファシン3mgを単回静脈内投与^{注2)}したとき、腎機能正常者(6例)と比較して、グアンファシンの尿中排泄率は各群でそれぞれ約75%及び約87%の低下、腎クリアランスは約85%及び約92%の低下であったものの、全身クリアランスは約14%及び約29%の低下であった¹⁰⁾(外国人データ)。[7.1、9.2.1参照]

注2)本剤の承認された用法は経口投与である。

16.7 薬物相互作用

16.7.1 CYP3A4/5阻害剤との併用

健康成人20例に、ケトコナゾール400mgを1日1回6日間反復投与での投与3日目にグアンファシン4mg単回投与を併用したとき、ケトコナゾール存在下でグアンファシンのC_{max}は約1.75倍に増加し、AUCは約2.79～3.13倍に増加した¹¹⁾(外国人データ)。[7.1、10.2参照]

16.7.2 CYP3A4/5誘導剤との併用

健康成人19例に、リファンピシン600mgを1日1回11日間反復投与での投与8日目にグアンファシン4mgの単回投与を併用したとき、リファンピシンの存在下でグアンファシンのC_{max}は約54%減少し、AUCは約63～69%減少した¹²⁾(外国人データ)。[10.2参照]

16.7.3 メチルフェニデート塩酸塩との併用

健康成人38例に、グアンファシン4mgとメチルフェニデート塩酸塩36mgを単回投与したとき、グアンファシンと*d*-メチルフェニデートのC_{max}及びAUCに影響は認められなかった¹³⁾(外国人データ)。

16.8 その他

グアンファシン徐放錠1mg「明治」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」(令和2年3月19日付け薬生薬審発0319第1号)に基づき、グアンファシン徐放錠3mg「明治」を標準製剤としたとき、溶出挙動が同等と判断され、生物学的に同等とみなされた¹⁴⁾。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈18歳未満の患者〉

17.1.1 国内第Ⅱ/Ⅲ相試験(二重盲検試験)

小児AD/HD患者(6歳以上18歳未満)を対象に実施したプラセボ対照二重盲検並行群間比較試験において、有効性の評価尺度であるADHD-RS-IV合計スコアの投与7週後のベースラインからの変化量は下表のとおりであった^{15,16)}。[5.1、9.7参照]

表1 ADHD-RS-IV合計スコアのベースラインからの変化量※1

投与群※2	ベースライン		投与7週後		変化量		プラセボとの比較
	例数	平均 (標準偏差)	例数	平均 (標準偏差)	調整平均値 (標準誤差)	調整平均値の差 [95%信頼区間]	p値※3
プラセボ	67	36.57 (8.57)	62	29.95 (12.19)	-6.70 (1.24)	—	—
0.08 mg/kg	65	36.95 (8.17)	61	22.41 (10.94)	-14.60 (1.25)	-7.89 [-11.14,-4.65]	<0.0001
0.12 mg/kg	66	35.98 (8.70)	54	18.31 (11.81)	-16.89 (1.29)	-10.19 [-13.48,-6.89]	<0.0001

※1：混合効果モデルに基づく解析

投与群、評価時点、投与群×評価時点交互作用を固定効果、ベースラインADHD-RS-IV合計スコア(40未満、40以上)及び年齢区分(13歳未満、13歳以上)を共変量、分散共分散構造は無構造とした。

※2：プラセボ群並びにグアンファシン塩酸塩徐放錠0.04、0.08及び0.12mg/kg群を設定し、ベースラインのADHD-RS-IV合計スコア(40未満、40以上)及び年齢(13歳未満、13歳以上)を因子とした確率最小化法を用いて割付を行った。ただし、体重が17kg以上25kg未満の被験者はグアンファシン塩酸塩徐放錠0.04mg/kg群に、75kg以上の被験者はグアンファシン塩酸塩徐放錠0.12mg/kg群に割付けないこととした。

※3：多重比較、固定順序法により投与7週後でのp値を算出
0.12mg/kg群とプラセボ群との比較(有意水準0.05)により有意差が認められた場合のみ0.08mg/kg群とプラセボ群との比較(有意水準0.05)を行う。

副作用は104/197例(52.8%)に認められた。主なものは、傾眠73例(37.1%)、頭痛17例(8.6%)であった。

17.1.2 国内第Ⅲ相試験(長期投与試験)

小児AD/HD患者(6歳以上18歳未満)を対象に実施したプラセボ対照二重盲検群間比較試験を完了した小児患者を対象に実施した長期投与試験において、有効性の評価尺度であるADHD-RS-IV合計スコアの推移は下表のとおりであった^{17,18)}。[5.1、9.7参照]

表2 ADHD-RS-IV合計スコアの推移

	プラセボ/グアンファシン塩酸塩徐放錠集団※1		グアンファシン塩酸塩徐放錠/グアンファシン塩酸塩徐放錠集団※2	
	例数	合計スコア	例数	合計スコア
二重盲検試験開始時	67	36.6 ± 8.6	197	36.3 ± 8.2
長期投与試験開始時	57	31.4 ± 12.6	165	25.9 ± 11.4
2週	56	26.4 ± 11.9	163	22.5 ± 12.2
4週	54	22.1 ± 10.8	159	19.6 ± 11.5
7週	52	20.0 ± 10.1	155	18.4 ± 11.5
23週	44	20.1 ± 9.6	142	17.3 ± 10.9
47週	36	19.6 ± 10.6	126	16.0 ± 10.5
51週	34	19.1 ± 10.9	125	16.2 ± 10.6
最終評価時	57	22.2 ± 12.0	165	18.8 ± 11.4

平均値 ± 標準偏差

※1：二重盲検試験でプラセボ群に割り付けられ、長期投与試験ではグアンファシン塩酸塩徐放錠を投与された集団

※2：二重盲検試験でグアンファシン塩酸塩徐放錠0.04mg/kg群、0.08mg/kg群又は0.12mg/kg群に割り付けられ、長期投与試験で引き続きグアンファシン塩酸塩徐放錠を投与された集団

副作用は156/222例(70.3%)に認められた。主なものは、傾眠120例(54.1%)、頭痛21例(9.5%)、血圧低下18例(8.1%)であった。

〈18歳以上の患者〉

17.1.3 国内第Ⅲ相試験(二重盲検試験)

18歳以上のAD/HD患者を対象に実施したプラセボ対照二重盲検並行群間比較試験において、有効性の評価尺度であるADHD-RS-IV with adult prompts日本語版合計スコアの投与10週後のベースラインからの変化量は下表のとおりであった¹⁹⁾。

表3 ADHD-RS-IV with adult prompts日本語版合計スコアのベースラインからの変化量※

投与群	ベースライン		投与10週後		変化量		プラセボとの比較
	例数	平均 (標準偏差)	例数	平均 (標準偏差)	調整平均値 (標準誤差)	調整平均値の差 [95%信頼区間]	p値
プラセボ	100	31.70 (6.83)	93	23.55 (10.29)	-7.27 (1.07)	—	—

投与群	ベースライン		投与10週後		変化量	プラセボとの比較	
	例数	平均 (標準偏差)	例数	平均 (標準偏差)	調整平均値 (標準誤差)	調整平均値の差 [95%信頼区間]	p値
グアンファシン塩酸塩徐放錠	100	31.45 (5.92)	79	19.53 (9.45)	-11.55 (1.10)	-4.28 [-6.67,-1.88]	0.0005

※：混合効果モデルに基づく解析

投与群、評価時点、投与群×評価時点の交互作用を固定効果、ベースラインADHD-RS-IV with adult prompts日本語版合計スコア(30未満、30以上)及びADHDサブタイプ(混合型、不注意優勢型、多動性・衝動性優勢型)を共変量、分散共分散構造は無構造とした。

副作用は72/101例(71.3%)に認められた。主なものは、傾眠33例(32.7%)、血圧低下21例(20.8%)、口渇20例(19.8%)、体位性めまい15例(14.9%)、便秘9例(8.9%)、浮動性めまい8例(7.9%)、徐脈8例(7.9%)であった。

17.1.4 国内第Ⅲ相試験(長期投与試験)

18歳以上のAD/HD患者を対象に実施したプラセボ対照二重盲検群間比較試験を完了した患者及び本臨床試験に新規に登録された18歳以上の成人AD/HD患者を対象に実施した長期投与試験において、有効性の評価尺度であるADHD-RS-IV with adult prompts日本語版合計スコアの推移は下表のとおりであった^{20,21)}。

表4 ADHD-RS-IV with adult prompts日本語版合計スコアの推移

	継続例				新規例※3	
	プラセボ/グアンファシン塩酸塩徐放錠集団※1		グアンファシン塩酸塩徐放錠/グアンファシン塩酸塩徐放錠集団※2			
	例数	合計スコア	例数	合計スコア	例数	合計スコア
二重盲検試験開始時	100	31.70 ± 6.83	100	31.45 ± 5.92	—	—
長期投与試験開始時	88	24.76 ± 10.54	62	22.31 ± 10.47	41	32.80 ± 5.94
1週	88	23.43 ± 10.50	62	20.82 ± 9.36	41	30.66 ± 6.25
2週	83	22.33 ± 10.64	61	19.64 ± 8.98	41	27.56 ± 7.62
3週	80	21.18 ± 11.23	61	18.82 ± 9.62	38	26.39 ± 7.35
4週	73	20.33 ± 11.56	58	18.14 ± 9.22	37	24.46 ± 7.58
5週	72	19.14 ± 11.21	58	16.83 ± 8.88	37	21.81 ± 7.78
6週	68	18.54 ± 10.95	55	16.07 ± 9.08	37	20.68 ± 6.94
18週	57	17.61 ± 11.39	51	14.49 ± 8.24	34	17.35 ± 7.07
26週	53	17.15 ± 11.55	48	13.17 ± 8.22	32	16.53 ± 8.52
38週	49	16.55 ± 12.19	47	12.13 ± 7.32	31	14.97 ± 8.06
50週	49	15.82 ± 11.69	45	11.80 ± 7.43	29	13.93 ± 8.42
最終評価時	88	18.82 ± 11.06	62	14.44 ± 9.26	41	16.27 ± 9.68

平均値 ± 標準偏差

※1：二重盲検試験でプラセボ群に割り付けられ、長期投与試験ではグアンファシン塩酸塩徐放錠を投与された集団

※2：二重盲検試験でグアンファシン塩酸塩徐放錠群に割り付けられ、長期投与試験で引き続きグアンファシン塩酸塩徐放錠を投与された集団

※3：長期投与試験で新規に登録されグアンファシン塩酸塩徐放錠を投与された集団

副作用は160/191例(83.8%)に認められた。主なものは、傾眠77例(40.3%)、口渇58例(30.4%)、血圧低下38例(19.9%)、体位性めまい34例(17.8%)、徐脈33例(17.3%)、倦怠感29例(15.2%)、便秘18例(9.4%)、浮動性めまい17例(8.9%)であった。

17.3 その他

17.3.1 QT間隔に対する影響

健康成人83例(試験完了例61例)を対象に、グアンファシン即放性製剤4mg単回投与時及び4～8mg漸増反復投与での8mg^(注)投与時のQT間隔に対する影響を検討した。ベースラインからの変化量[QTcF(Fridericia補正)間隔]におけるプラセボ投与時との差の最大平均値(片側95%信頼区間上限値)は、4mg投与では4.55(6.52)msec、8mg投与では7.61(10.34)msecであり、QTc間隔の延長が認められた²²⁾(外国人データ)。[8.4、9.1.3参照]
注)本剤の承認された最高用量は6mgである。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

グアンファシンはアドレナリン受容体(α2A)に対して親和性を示し²³⁾、α2アドレナリン受容体を介した直接的なノルアドレナリンのシナプス伝達調整により、前頭前皮質及び大脳基底核におけるシグナルを調整している可能性が示唆されている^{24,25)}が、AD/HDの治療効果における詳細な作用機序は不明である。


18.2 薬理作用

AD/HDモデル動物である自然発症高血圧ラットにおいて、多動性及び衝

動性のいずれの指標に対しても改善効果が認められた²⁶⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般の名称：グアンファシン塩酸塩 (Guanfacine Hydrochloride)
化学名：N-Amidino-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide monohydrochloride
分子式：C₉H₉Cl₂N₃O・HCl
分子量：282.55
性 状：グアンファシン塩酸塩は白色～類白色の粉末である。
化学構造式：



22. 包装

〈グアンファシン徐放錠1mg「明治」〉
PTP包装(乾燥剤入) 100錠(10錠×10)
〈グアンファシン徐放錠3mg「明治」〉
PTP包装(乾燥剤入) 100錠(10錠×10)

23. 主要文献

- 1)健康成人における高用量薬物動態試験(インチュニブ錠：2019年6月18日承認、申請資料概要2.7.2.2)
- 2)小児AD/HD患者における母集団薬物動態解析(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.7.2.3)
- 3)社内資料：グアンファシン徐放錠3mg「明治」の生物学的同等性試験に関する資料
- 4)健康成人における生物学的同等性試験(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.7.1.2、2.7.1.3)
- 5)Carchman,S.H. et al.：J Clin Pharmacol.1987；27：762-767
- 6)健康成人における反復経口投与後の代謝物検索(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.7.2.2、2.7.2.3)
- 7)責任代謝酵素同定試験(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.7.2.2)
- 8)日本人健康成人における薬物動態試験(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.7.2.2)
- 9)ヒトトランスポーターに対する基質評価及び阻害評価(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.6.4.7)
- 10)Kirch,W. et al.：Clin. Pharmacokinetics.1980；5：476-483
- 11)薬物相互作用試験-ケトコナゾール-(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.7.6.4)
- 12)薬物相互作用試験-リファンピシン-(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.7.6.5)
- 13)薬物相互作用試験-メチルフェニデート-(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.7.6.6)
- 14)社内資料：グアンファシン徐放錠1mg「明治」の溶出性(生物学的同等性試験)に関する資料
- 15)市川宏伸ほか：臨床精神薬理.2018；21：1093-1117
- 16)日本人小児AD/HD患者を対象とした第2/3相試験(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.7.6.10)
- 17)小児AD/HD患者の第2/3相長期投与試験(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.7.6.20)
- 18)継続投与試験(A3131試験)(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、審査報告書)
- 19)成人AD/HD患者の第3相試験(インチュニブ錠：2019年6月18日承認、申請資料概要2.7.6.2)
- 20)成人AD/HD患者の第3相長期投与試験(インチュニブ錠：2019年6月18日承認、申請資料概要2.7.6.3)
- 21)国内長期投与試験(A3133試験)(インチュニブ錠：2019年6月18日承認、審査報告書)
- 22)QT/QTc評価試験(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.7.6.8)
- 23)ヒトα2アドレナリン受容体親和性及び選択性(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.6.2.2)
- 24)脳内局所作用(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.6.2.3)
- 25)作用機序(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.6.2.6)
- 26)in vivo薬理試験(インチュニブ錠：2017年3月30日承認、申請資料概要2.6.2.2)

24. 文献請求先及び問い合わせ先

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室
〒104-8002 東京都中央区京橋2-4-16
フリーダイヤル(0120)093-396 電話(03)3273-3539
FAX(03)3272-2438

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋 2 - 4 - 16